

## Índice

|                                                                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>14 Consecuencias de la violencia en la pareja .....</b>                                                                                                     | <b>1</b> |
| 14.1 Lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja .....                                                                             | 1        |
| 14.1.1 Lesiones a lo largo de la vida como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja .....                                                     | 1        |
| 14.1.1.1 Lesiones a lo largo de la vida como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja, por tipo de lesión .....                               | 2        |
| 14.1.1.2 Lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja, según las principales características sociodemográficas de las mujeres ..... | 3        |
| 14.1.2 Lesiones en los últimos 12 meses y en los últimos 4 años como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja.....                            | 8        |
| 14.2 Embarazo como consecuencia de la violación de la pareja .....                                                                                             | 10       |
| 14.3 Asistencia médica tras los episodios de violencia física o sexual de la pareja .....                                                                      | 10       |
| 14.4 Consecuencias psicológicas de los episodios de violencia en la pareja.....                                                                                | 11       |
| 14.5 Consumo de sustancias para afrontar los episodios de violencia en la pareja.....                                                                          | 13       |
| 14.6 Discapacidad como consecuencia de la violencia en la pareja .....                                                                                         | 14       |
| 14.7 Absentismo laboral como consecuencia de la violencia en la pareja .....                                                                                   | 14       |
| 14.8 Secuelas de la violencia de la pareja.....                                                                                                                | 15       |
| 14.9 Impacto de la violencia de la pareja en la salud, la asistencia a servicios sanitarios, el consumo de sustancias y la percepción de inseguridad .....     | 16       |
| 14.9.1 Estado de salud autopercebido y síntomas de mala salud sufridos con frecuencia en los 12 meses previos a las entrevistas .....                          | 17       |
| 14.9.2 Asistencia a servicios sanitarios en los 12 meses previos a las entrevistas .....                                                                       | 18       |
| 14.9.3 Pensamientos e intentos de suicidio.....                                                                                                                | 19       |
| 14.9.4 Consumo de medicamentos y sustancias (tabaco, alcohol, marihuana y otras drogas).....                                                                   | 21       |
| 14.9.4.1 Consumo de medicamentos .....                                                                                                                         | 21       |
| 14.9.4.2 Consumo de tabaco o cigarrillos electrónicos .....                                                                                                    | 22       |
| 14.9.4.3 Consumo de bebidas alcohólicas .....                                                                                                                  | 23       |
| 14.9.4.4 Consumo de otras drogas .....                                                                                                                         | 24       |
| 14.9.5 Percepción de inseguridad .....                                                                                                                         | 26       |

## 14 Consecuencias de la violencia en la pareja

En este capítulo se abordan distintos aspectos relacionados con las consecuencias de la violencia en la pareja, tales como la existencia de lesiones, asistencia hospitalaria, secuelas psicológicas, o consumo de sustancias para afrontar lo sucedido, entre otros. El capítulo comienza estudiando diversos aspectos relacionados con las lesiones físicas que la violencia física o sexual generó en las mujeres afectadas, como el momento en el que tuvieron lugar (a lo largo de la vida, últimos 4 años, últimos 12 meses) o el tipo de lesión sufrida. También se relaciona la existencia de lesiones físicas a lo largo de la vida con las principales características sociodemográficas de la mujer. El capítulo continúa con un análisis sobre si la violencia física o sexual requirió asistencia médica. Después se procede a analizar una serie de preguntas que se hacen a todas las mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o han sentido miedo de sus parejas (VFSEM, en adelante): las consecuencias psicológicas derivadas de los episodios de violencia, o si la mujer tuvo que consumir alcohol, drogas o medicamentos para afrontar lo sucedido, entre otros aspectos. Tras ello se explora si, en las mujeres con discapacidad acreditada o con limitaciones, estas son consecuencia de la violencia producida por la pareja. También se analiza si alguno de los episodios de violencia impidió a la mujer acudir a su trabajo o lugar de estudios durante un tiempo, si la mujer sufrió la violencia durante el embarazo, y si considera que en la actualidad sigue teniendo secuelas físicas o psicológicas como consecuencia de la violencia sufrida. Finalmente, se analiza el impacto de la violencia de la pareja en la salud, la asistencia a servicios sanitarios, el consumo de sustancias y la percepción de inseguridad de las mujeres afectadas, mediante la comparación de la respuesta a determinadas preguntas de las mujeres que han sufrido violencia de la pareja con la de las mujeres que nunca han sufrido violencia de la pareja.

### 14.1 Lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja

#### 14.1.1 *Lesiones a lo largo de la vida como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja*

El 48,4% de las mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja, ha tenido alguna lesión física como consecuencia de esta violencia. Suponen el 6,1% (1.303.064) de las mujeres residentes en España de 16 o más años (Tabla 14.1).

El 27,9% (114.764) de las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual de la pareja actual ha tenido lesiones como consecuencia de la violencia de esta pareja. Entre las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual de alguna pareja pasada, el 51,0% (1.213.252) ha padecido lesiones por la violencia de estas parejas pasadas.

Tabla 14.1 Lesiones a lo largo de la vida como consecuencia de la violencia física y/o sexual de alguna pareja

|               | Pareja actual        |                   | Parejas pasadas      |                   | Cualquier pareja     | Total de mujeres   | Número de mujeres |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|               | % <sup>1</sup>       | Número de mujeres | % <sup>2</sup>       | Número de mujeres | % <sup>3</sup>       | % <sup>4</sup>     |                   |
| <b>Sí</b>     | <b>27,9</b>          | <b>114.764</b>    | <b>51,0</b>          | <b>1.213.252</b>  | <b>48,4</b>          | <b>6,1</b>         | <b>1.303.064</b>  |
| <b>IC 95%</b> | <b>(22,0 - 34,4)</b> |                   | <b>(48,1 - 53,9)</b> |                   | <b>(45,7 - 51,1)</b> | <b>(5,7 - 6,6)</b> |                   |
| <b>No</b>     | 69,6                 |                   | 47,0                 |                   | 49,6                 | 93,6               |                   |
| <b>NC</b>     | 2,5                  |                   | 1,9                  |                   | 2,0                  | 0,3                |                   |
| <b>Total</b>  | 100,0                |                   | 100,0                |                   | 100,0                | 100,0              |                   |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de la pareja actual; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de parejas pasadas; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

IC= Intervalo de confianza

El símbolo "" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

#### 14.1.1.1 Lesiones a lo largo de la vida como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja, por tipo de lesión

En la Tabla 14.2 pueden verse los tipos de lesiones que han tenido las mujeres víctimas de violencia física o sexual en la pareja. La lesión que se ha presentado más frecuentemente es la relativa a tener cortes, rasguños, moratones o dolores: la mencionan el 38,8% (1.044.453) de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja (18,7% de las que han sufrido violencia física o sexual de la pareja actual, 41,4% de las que han sufrido violencia física o sexual de parejas pasadas). Le siguen a bastante distancia las lesiones en los ojos u oídos, esguinces, luxaciones o quemaduras (13,2% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja - 355.150 mujeres), y haber contraído una infección de transmisión sexual (10,0% - 268.202 mujeres). El 5,2% (138.793) de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, manifiestan haber tenido un aborto involuntario como consecuencia, el 6,6% (177.053) han tenido lesiones en los genitales, y al 4,6% (122.990) la violencia física o sexual de alguna pareja les ha producido algún daño físico permanente.

Tabla 14.2 Tipos de lesiones físicas como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja

|                                                                                                                                      | Pareja actual  |                   | Parejas pasadas |                   | Cualquier pareja |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                      | % <sup>1</sup> | Número de mujeres | % <sup>2</sup>  | Número de mujeres | % <sup>3</sup>   | Número de mujeres |
| 1. Cortes, rasguños, moratones o dolores                                                                                             | 18,7           | 76.778            | 41,4            | 984.708           | 38,8             | 1.044.453         |
| 2. Lesiones en sus ojos u oídos, esguinces, luxaciones o quemaduras                                                                  | 4,4            | 18.135            | 14,3            | 339.518           | 13,2             | 355.150           |
| 3. Heridas profundas, fracturas de huesos, dientes rotos, lesiones internas o cualquier otra lesión similar                          | .              | .                 | 7,4             | 175.614           | 6,8              | 181.802           |
| 4. Aborto involuntario                                                                                                               | 3,0            | 12.276            | 5,3             | 126.517           | 5,2              | 138.793           |
| 5. Lesiones en los genitales                                                                                                         | .              | .                 | 7,4             | 175.196           | 6,6              | 177.053           |
| 6. Ha contraído alguna enfermedad de transmisión sexual (de forma temporal o crónica)                                                | 4,3            | 17.508            | 10,6            | 252.436           | 10               | 268.202           |
| 7. Le ha producido algún daño físico permanente (cicatrices, pérdida de visión o audición, VIH, problemas respiratorios crónicos...) | .              | .                 | 5,1             | 121.426           | 4,6              | 122.990           |
| 8. Alguna otra lesión de tipo físico                                                                                                 | .              | .                 | 8,9             | 212.545           | 8,2              | 221.941           |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de la pareja actual; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de parejas pasadas; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja.

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

El símbolo '""' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

#### 14.1.1.2 Lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja, según las principales características sociodemográficas de las mujeres

En este apartado se presenta la existencia de lesiones como consecuencia de la violencia según las características sociodemográficas de las mujeres. Se muestran los resultados para la violencia sufrida de parejas pasadas y de cualquier pareja (actual o pasada)<sup>1</sup>.

En el análisis de la violencia según características sociodemográficas hay que tener presente que existen numerosas interrelaciones entre las variables, y que diferencias aparentes en una variable pueden desaparecer si se tienen en cuenta otras<sup>2</sup>. Además, los resultados deben entenderse en el sentido de ser factores de riesgo o protección, y no determinantes absolutos.

La **edad** (Tabla 14.3) muestra pocas diferencias entre las distintas categorías y no se aprecia un patrón claro, siendo las mujeres de 65 a 74 años las que en mayor medida han tenido lesiones (58,7%) como consecuencia de la violencia física o sexual de alguna pareja, y las de 75 y más las que menos lesiones han padecido (36,9%) junto con las mujeres de 16 a 24 años (39,0%).

<sup>1</sup> En el caso de las lesiones como consecuencia de la violencia de la pareja actual, la frecuencia muestral al desagregar por categorías las variables sociodemográficas es demasiado pequeña por lo que no se muestran los resultados.

<sup>2</sup> Mediante la realización de modelos de regresión logística, por ejemplo.

Tabla 14.3 Lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja (parejas pasadas, cualquier pareja), según la edad de la mujer

|                                        | Parejas pasadas |                   | Cualquier pareja |                   |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                        | % <sup>1</sup>  | Número de mujeres | % <sup>2</sup>   | Número de mujeres |
| <b>16-24</b>                           | 41,1            | 99.548            | 39,0             | 102.160           |
| <b>25-34</b>                           | 54,6            | 261.816           | 51,3             | 273.975           |
| <b>35-44</b>                           | 52,3            | 272.297           | 49,4             | 286.021           |
| <b>45-54</b>                           | 48,4            | 242.393           | 46,9             | 274.919           |
| <b>55-64</b>                           | 54,0            | 194.824           | 50,3             | 202.667           |
| <b>65-74</b>                           | 60,4            | 96.656            | 58,7             | 113.133           |
| <b>75+</b>                             | 40,2            | 45.718            | 36,9             | 50.190            |
| <i>Diferencias significativas (X2)</i> |                 | <i>ns</i>         |                  | <i>p&lt;0,05</i>  |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de parejas pasadas en cada grupo de edad;

2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja en cada grupo de edad.

ns= no significativo

En la Tabla 14.4 se recoge la tasa de lesiones según el nivel de formación y el país de nacimiento. El **grado de urbanización del municipio** de la mujer no presenta diferencias estadísticamente significativas por lo que no se muestra en la tabla.

Con respecto al **nivel de formación**, las mujeres con estudios universitarios han sufrido lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja en bastante menor medida (36,7%) que el resto de mujeres, siendo en este caso las mujeres con estudios secundarios de primera etapa (59,0%) y las mujeres con estudios primarios o inferiores (52,3%) las que más han tenido lesiones. Este resultado respalda la hipótesis planteada en capítulos previos relativa a que las mujeres con estudios superiores revelan más situaciones de violencia en la pareja, pero de menor gravedad y por tanto menos susceptibles de producir lesiones físicas.

En cuanto al **país de nacimiento**, el 59,7% de las mujeres nacidas en el extranjero han tenido lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de alguna pareja frente al 44,6% de las mujeres nacidas en España.

Tabla 14.4 Lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja (parejas pasadas, cualquier pareja), según el nivel de formación y el país de nacimiento

|                           |                                        | Parejas pasadas |                   | Cualquier pareja |                   |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                           |                                        | % <sup>1</sup>  | Número de mujeres | % <sup>2</sup>   | Número de mujeres |
| <b>Nivel de formación</b> | Estudios primarios o inferiores        | 55,3            | 127.934           | 52,3             | 135.848           |
|                           | Estudios secundarios (1.ª etapa)       | 61,9            | 338.323           | 59,0             | 367.685           |
|                           | Estudios secundarios (2.ª etapa)       | 53,2            | 274.881           | 51,1             | 297.404           |
|                           | FP de grado superior                   | 50,6            | 158.270           | 48,9             | 172.296           |
|                           | Estudios universitarios                | 39,8            | 280.053           | 36,7             | 294.160           |
|                           | <i>Diferencias significativas (X2)</i> |                 | <i>p&lt;0,001</i> |                  | <i>p&lt;0,001</i> |
| <b>País de nacimiento</b> | España                                 | 47,4            | 848.953           | 44,6             | 902.106           |
|                           | Otro país                              | 62,1            | 364.299           | 59,7             | 400.958           |
|                           | <i>Diferencias significativas (X2)</i> |                 | <i>p&lt;0,001</i> |                  | <i>p&lt;0,001</i> |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de parejas pasadas en cada categoría de cada variable; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja en cada categoría de cada variable.

En la Tabla 14.5 se muestra la tasa de lesiones según la situación laboral de la mujer, sus ingresos mensuales netos y los ingresos mensuales netos del hogar. El análisis de la **situación laboral** muestra, en el caso de las lesiones producidas por la violencia física o sexual ejercida por cualquier pareja (actual o pasada), que las mujeres pensionistas (62,5%) y las paradas (60,4%) son las que en mayor medida han tenido lesiones mientras que las que trabajan por cuenta propia (37,7%) y las estudiantes (40,5%) son las que tienen menores tasas de lesiones.

El 53,2% de las mujeres con **ingresos** netos mensuales inferiores o iguales a 900€ han tenido lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de cualquier pareja, frente al 35,4% de las mujeres con ingresos mensuales superiores a 3.000€.

Algo similar, pero con mayor significación estadística, sucede con los **ingresos netos del hogar**, lo cual era esperable debido a la correlación existente entre ambas variables. Así, cuanto mayores son los ingresos netos del hogar, menor es el porcentaje de mujeres que han tenido lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de cualquier pareja: el 62,2% de las mujeres que viven en hogares con ingresos menores o iguales a 900€ ha tenido lesiones frente al 48,2% de las que viven en hogares con ingresos mensuales de entre 900 y 3.000 € y al 36,5% de las que viven en hogares con ingresos mensuales superiores a 3.000€.

Tabla 14.5 Lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja (parejas pasadas, cualquier pareja), según la situación laboral de la mujer, sus ingresos netos y los ingresos netos del hogar

|                                   |                                                 | Parejas pasadas |                   | Cualquier pareja |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                   |                                                 | % <sup>1</sup>  | Número de mujeres | % <sup>2</sup>   | Número de mujeres |
| <b>Situación laboral actual</b>   | Trabaja por cuenta ajena                        | 48,7            | 589.715           | 46,3             | 633.128           |
|                                   | Trabaja por cuenta propia o en negocio familiar | 42,0            | 59.911            | 37,7             | 64.000            |
|                                   | Parada                                          | 63,2            | 174.982           | 60,4             | 185.380           |
|                                   | Jubilada                                        | 55,4            | 91.618            | 52,5             | 105.169           |
|                                   | Pensionista                                     | 63,0            | 86.613            | 62,5             | 89.983            |
|                                   | Estudiante                                      | 40,5            | 70.717            | 40,5             | 74.248            |
|                                   | Trabajo doméstico no remunerado                 | 50,5            | 74.171            | 43,7             | 81.733            |
|                                   | <i>Diferencias significativas (X2)</i>          |                 | <i>p&lt;0,01</i>  |                  | <i>p&lt;0,001</i> |
| <b>Ingresos netos de la mujer</b> | Hasta 900 €                                     | 56,0            | 385.169           | 53,2             | 420.554           |
|                                   | 901-3.000 €                                     | 48,7            | 546.254           | 45,8             | 578.815           |
|                                   | Más de 3.000 €                                  | 38,9            | 29.635            | 35,4             | 32.700            |
|                                   | <i>Diferencias significativas (X2)</i>          |                 | <i>p&lt;0,05</i>  |                  | <i>p&lt;0,05</i>  |
| <b>Ingresos netos del hogar</b>   | Hasta 900 €                                     | 63,7            | 181.731           | 62,2             | 181.731           |
|                                   | 901-3.000 €                                     | 51,2            | 579.367           | 48,2             | 629.472           |
|                                   | Más de 3.000 €                                  | 39,8            | 142.965           | 36,5             | 156.351           |
|                                   | <i>Diferencias significativas (X2)</i>          |                 | <i>p&lt;0,001</i> |                  | <i>p&lt;0,001</i> |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de parejas pasadas en cada categoría de cada variable; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja en cada categoría de cada variable.

El símbolo "" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

En la Tabla 14.6 se muestra la tasa de lesiones según la **existencia de limitaciones** para realizar actividades cotidianas debido a alguna enfermedad o problema de salud crónicos en los 12 meses previos a las entrevistas. El grado de **discapacidad** reconocido no presenta diferencias estadísticamente significativas por lo que no se muestra en la tabla.

Con respecto a la existencia de **limitaciones**, las mujeres que consideran que están gravemente limitadas son las que en mayor medida han tenido lesiones (61,3%) mientras que las que afirman no tener limitaciones son las que en menor medida las han tenido (45,7%).

Tabla 14.6 Lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja (parejas pasadas, cualquier pareja), según el grado de discapacidad y la existencia de limitaciones en la actividad de la mujer

|                                     |                                        | Parejas pasadas |                   | Cualquier pareja |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                     |                                        | % <sup>1</sup>  | Número de mujeres | % <sup>2</sup>   | Número de mujeres |
| <b>Limitaciones en la actividad</b> | No tiene limitaciones                  | 48,7            | 849.499           | 45,7             | 904.353           |
|                                     | Ligeramente limitada                   | 57,7            | 155.663           | 55,1             | 170.775           |
|                                     | Moderadamente limitada                 | 53,1            | 131.382           | 52,5             | 147.609           |
|                                     | Gravemente limitada                    | 62,6            | 61.692            | 61,3             | 65.312            |
|                                     | <i>Diferencias significativas (X2)</i> |                 | <i>ns</i>         |                  | <i>p&lt;0,05</i>  |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de parejas pasadas en cada categoría;

2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja en cada categoría.

ns= no significativo

Con respecto a la **edad del primer matrimonio** (Tabla 14.7), las mujeres que se casaron antes de los 18 años han tenido lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de cualquier pareja en mayor medida (63,7%) que las que se casaron entre los 18 y los 24 años (51,7%), con 25 o más años (47,0%), o que las que nunca han estado casadas (45,9%).

La variable que recoge si las mujeres viven en **hogares en los que hay personas menores** de edad no presenta diferencias estadísticamente significativas por lo que no se muestra en la tabla.

*Tabla 14.7 Lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja (parejas pasadas, cualquier pareja), según la edad a la que se casó por primera vez la mujer*

|                               |                                        | Parejas pasadas |                   | Cualquier pareja |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                               |                                        | % <sup>1</sup>  | Número de mujeres | % <sup>2</sup>   | Número de mujeres |
| <b>Edad primer matrimonio</b> | Nunca ha estado casada                 | 48,2            | 531.980           | 45,9             | 548.390           |
|                               | Antes de los 18 años                   | 64,9            | 79.931            | 63,7             | 84.261            |
|                               | 18-24                                  | 55,3            | 293.261           | 51,7             | 318.542           |
|                               | 25+                                    | 49,7            | 307.324           | 47,0             | 351.115           |
|                               | <i>Diferencias significativas (X2)</i> |                 | <i>p&lt;0,05</i>  |                  | <i>p&lt;0,05</i>  |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de parejas pasadas en cada categoría;

2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja en cada categoría.

Para finalizar este epígrafe, se analiza la tasa de lesiones según la vía de cumplimentación de la entrevista (CAWI, CASI, CAPI)<sup>3</sup>. La tasa de lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de alguna pareja (Tabla 14.8) entre quienes han respondido por CAWI es de un 43,5% frente al 56,3% de quienes han respondido por CAPI. Este resultado, unido al obtenido en capítulos previos sobre prevalencias de violencia y denuncia, puede indicar, tal y como ya se ha señalado anteriormente, que las mujeres que responden por CAWI revelan más episodios de violencia pero de menor gravedad y que por tanto se traducen en un menor porcentaje de lesiones.

*Tabla 14.8 Lesiones como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja (parejas pasadas, cualquier pareja), según la vía de cumplimentación de la entrevista (CAWI, CASI, CAPI)*

|                                        | Parejas pasadas   | Cualquier pareja  |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                        | % <sup>1</sup>    | % <sup>2</sup>    |
| <b>CAWI</b>                            | 46,5              | 43,5              |
| <b>CASI</b>                            | 46,1              | 44,4              |
| <b>CAPI</b>                            | 58,2              | 56,3              |
| <i>Diferencias significativas (X2)</i> | <i>p&lt;0,001</i> | <i>p&lt;0,001</i> |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de parejas pasadas en cada categoría;

2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja en cada categoría.

<sup>3</sup> Pueden encontrarse más detalles sobre la vía de cumplimentación en el anexo metodológico.

### 14.1.2 Lesiones en los últimos 12 meses y en los últimos 4 años como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja

El 7,5% de las mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja ha tenido, en los 12 meses previos a las entrevistas, alguna lesión física como consecuencia de esta violencia. Suponen el 0,9% (200.654) de las mujeres residentes en España de 16 o más años (Tabla 14.9).

El 9,8% (40.157) de las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual de la pareja actual ha tenido lesiones en los 12 meses previos a las entrevistas como consecuencia de la violencia de esta pareja. Entre las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual de alguna pareja pasada, el 7,0% (165.635) ha padecido lesiones en los últimos 12 meses por la violencia de estas parejas pasadas.

Tabla 14.9 Lesiones en los últimos 12 meses como consecuencia de la violencia física y/o sexual de alguna pareja

|               | Pareja actual       |                   | Parejas pasadas    |                   | Cualquier pareja   | Total de mujeres   | Número de mujeres |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|               | % <sup>1</sup>      | Número de mujeres | % <sup>2</sup>     | Número de mujeres | % <sup>3</sup>     | % <sup>4</sup>     |                   |
| <b>Sí</b>     | <b>9,8</b>          | <b>40.157</b>     | <b>7,0</b>         | <b>165.635</b>    | <b>7,5</b>         | <b>0,9</b>         | <b>200.654</b>    |
| <b>IC 95%</b> | <b>(6,2 - 14,5)</b> |                   | <b>(5,6 - 8,6)</b> |                   | <b>(6,1 - 9,0)</b> | <b>(0,8 - 1,1)</b> |                   |
| <b>No</b>     | 86,5                |                   | 90,9               |                   | 90,2               | 98,8               |                   |
| <b>NC</b>     | 3,7                 |                   | 2,1                |                   | 2,4                | 0,3                |                   |
| <b>Total</b>  | 100,0               |                   | 100,0              |                   | 100,0              | 100,0              |                   |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de la pareja actual; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de parejas pasadas; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

IC= Intervalo de confianza

El símbolo "''" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

Ampliando el horizonte temporal a los últimos 4 años, el 15,3% de las mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja ha tenido, en los 4 años previos a las entrevistas, alguna lesión física como consecuencia de esta violencia. Suponen el 1,9% (410.686) de las mujeres residentes en España de 16 o más años (Tabla 14.10).

El 13,7% (56.371) de las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual de la pareja actual ha tenido lesiones en los 4 años previos a las entrevistas como consecuencia de la violencia de esta pareja. Entre las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual de alguna pareja pasada, el 15,4% (366.788) ha padecido lesiones en los últimos 4 años por la violencia de estas parejas pasadas.

Tabla 14.10 Lesiones en los últimos 4 años como consecuencia de la violencia física y/o sexual de alguna pareja

|               | Pareja actual       |                   | Parejas pasadas      |                   | Cualquier pareja     | Total de mujeres   | Número de mujeres |
|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|               | % <sup>1</sup>      | Número de mujeres | % <sup>2</sup>       | Número de mujeres | % <sup>3</sup>       | % <sup>4</sup>     |                   |
| <b>Sí</b>     | <b>13,7</b>         | <b>56.371</b>     | <b>15,4</b>          | <b>366.788</b>    | <b>15,3</b>          | <b>1,9</b>         | <b>410.686</b>    |
| <b>IC 95%</b> | <b>(9,4 - 19,0)</b> |                   | <b>(13,4 - 17,6)</b> |                   | <b>(13,4 - 17,3)</b> | <b>(1,7 - 2,2)</b> |                   |
| <b>No</b>     | 82,6                |                   | 82,6                 |                   | 82,4                 | 97,8               |                   |
| <b>NC</b>     | 3,7                 |                   | 2,0                  |                   | 2,3                  | 0,3                |                   |
| <b>Total</b>  | 100,0               |                   | 100,0                |                   | 100,0                | 100,0              |                   |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de la pareja actual; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de parejas pasadas; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.  
IC= Intervalo de confianza

En la (Tabla 14.11) se muestra la prevalencia en los últimos 4 años de cada tipo de lesión para las mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de cualquier pareja (actual o pasada) o de parejas pasadas. No se muestran de forma diferenciada los resultados para la pareja actual por no haber suficiente frecuencia muestral para ello. La lesión que se ha presentado más frecuentemente en los últimos 4 años es la relativa a tener cortes, rasguños, moratones o dolores: la mencionan el 10,7% (288.154) de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja. Le siguen a bastante distancia haber contraído una infección de transmisión sexual (3,6% - 95.664 mujeres), las lesiones en los ojos u oídos, esguinces, luxaciones o quemaduras (3,4% - 92.365 mujeres), y las lesiones en los genitales (3,3% - 88.890 mujeres).

Tabla 14.11 Tipos de lesiones físicas que se han tenido en los últimos 4 años como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja

|                                                                                                                                      | Parejas pasadas |                   | Cualquier pareja |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                      | % <sup>1</sup>  | Número de mujeres | % <sup>2</sup>   | Número de mujeres |
| 1. Cortes, rasguños, moratones o dolores                                                                                             | 10,9            | 258.676           | 10,7             | 288.154           |
| 2. Lesiones en sus ojos u oídos, esguinces, luxaciones o quemaduras                                                                  | 3,7             | 88.062            | 3,4              | 92.365            |
| 3. Heridas profundas, fracturas de huesos, dientes rotos, lesiones internas o cualquier otra lesión similar                          | 1,5             | 35.732            | 1,4              | 38.938            |
| 4. Aborto involuntario                                                                                                               | 1,7             | 41.051            | 1,7              | 46.476            |
| 5. Lesiones en los genitales                                                                                                         | 3,6             | 85.132            | 3,3              | 88.890            |
| 6. Ha contraído alguna enfermedad de transmisión sexual (de forma temporal o crónica)                                                | 3,7             | 88.591            | 3,6              | 95.664            |
| 7. Le ha producido algún daño físico permanente (cicatrices, pérdida de visión o audición, VIH, problemas respiratorios crónicos...) | 1,9             | 44.067            | 1,6              | 44.067            |
| 8. alguna otra lesión de tipo físico                                                                                                 | 2,7             | 63.747            | 2,7              | 71.544            |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de parejas pasadas; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja.

El símbolo "1" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

## 14.2 Embarazo como consecuencia de la violación de la pareja

El 10,6% (132.404) de las mujeres que han sufrido una violación de alguna pareja, se han quedado embarazadas como consecuencia de la violación (Tabla 14.12)<sup>4</sup>. Suponen el 0,6% de las mujeres 16 o más años residentes en España.

Tabla 14.12 Embarazo como consecuencia de la violación de alguna pareja

|               | Parejas pasadas     |                   | Cualquier pareja    | Total de mujeres   | Número de mujeres |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|               | % <sup>1</sup>      | Número de mujeres | % <sup>2</sup>      | % <sup>3</sup>     |                   |
| <b>Sí</b>     | <b>11,1</b>         | <b>124.106</b>    | <b>10,6</b>         | <b>0,6</b>         | <b>132.404</b>    |
| <b>IC 95%</b> | <b>(8,7 - 14,0)</b> |                   | <b>(8,3 - 13,2)</b> | <b>(0,5 - 0,8)</b> |                   |
| <b>No</b>     | 87,5                |                   | 88,1                | 99,3               |                   |
| <b>NC</b>     | 1,3                 |                   | 1,3                 | 0,1                |                   |
| <b>Total</b>  | 100,0               |                   | 100,0               | 100,0              |                   |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido una violación de parejas pasadas; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido una violación de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.  
IC= Intervalo de confianza

## 14.3 Asistencia médica tras los episodios de violencia física o sexual de la pareja

A las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja se les preguntaba si, tras los episodios de violencia, tuvieron que recibir asistencia médica (Tabla 14.13). El 6,4%<sup>5</sup> de las mujeres que han padecido violencia física o sexual de la pareja actual recibieron algún tipo de asistencia médica, o declaran que no tuvieron asistencia médica pero que la hubiesen necesitado, frente al 32,2% de las que sufrieron esta violencia de parejas pasadas. En el caso concreto de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de parejas pasadas, el 3,8% tuvieron que permanecer en el hospital, el 17,0% no tuvieron que permanecer en el hospital pero sí recibieron atención sanitaria y el 11,4% afirman que no recibieron atención sanitaria pero que la hubiesen necesitado.

<sup>4</sup> No hay frecuencia muestral suficiente para mostrar de forma diferenciada los resultados para la pareja actual.

<sup>5</sup> La frecuencia muestral es demasiado pequeña en algunas categorías por lo que se proporcionan los resultados agregados.

Tabla 14.13 Asistencia sanitaria tras los episodios de violencia física o sexual de la pareja

|                                                                                                                                 | Pareja actual  |                   | Parejas pasadas |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                 | % <sup>1</sup> | Número de mujeres | % <sup>2</sup>  | Número de mujeres |
| 1. Sí, tuve que permanecer en el hospital                                                                                       | .              | .                 | 3,8             | 89.460            |
| 2. Sí, me atendió alguien de los servicios médicos (consulta médica, enfermería...), pero no tuve que permanecer en el hospital | 2,6            | 10.829            | 17,0            | 404.769           |
| 3. No, no la necesité                                                                                                           | 88,0           | 361.947           | 66,1            | 1.570.617         |
| 4. No, pero debería haberla recibido                                                                                            | .              | .                 | 11,4            | 271.691           |
| NC                                                                                                                              | 5,6            | 22.988            | 1,7             | 40.875            |
| Total                                                                                                                           | 100,0          | 411.456           | 100,0           | 2.377.412         |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física o sexual de su pareja actual; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física o sexual de parejas pasadas.

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

El símbolo '""' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

## 14.4 Consecuencias psicológicas de los episodios de violencia en la pareja

El 73,5% de las mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja, ha tenido consecuencias psicológicas derivadas de esta violencia. Suponen el 16,9% (3.604.385) de las mujeres residentes en España de 16 o más años (Tabla 14.14).

El 54,4% (707.316) de las mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja actual ha tenido consecuencias psicológicas derivadas de los episodios de VFSEM de esta pareja. Entre las mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja pasada, el 77,0% (3.106.859) ha tenido consecuencias psicológicas debidas a la violencia de estas parejas pasadas.

Tabla 14.14 Consecuencias psicológicas de los episodios de violencia (VFSEM) de la pareja

|               | Pareja actual        |                   | Parejas pasadas      |                   | Cualquier pareja     | Total de mujeres     | Número de mujeres |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|               | % <sup>1</sup>       | Número de mujeres | % <sup>2</sup>       | Número de mujeres | % <sup>3</sup>       | % <sup>4</sup>       |                   |
| <b>Sí</b>     | <b>54,4</b>          | <b>707.316</b>    | <b>77,0</b>          | <b>3.106.859</b>  | <b>73,5</b>          | <b>16,9</b>          | <b>3.604.385</b>  |
| <b>IC 95%</b> | <b>(50,5 - 58,3)</b> |                   | <b>(75,1 - 78,8)</b> |                   | <b>(71,7 - 75,2)</b> | <b>(16,2 - 17,7)</b> |                   |
| <b>No</b>     | 42,8                 |                   | 21,6                 |                   | 24,9                 | 82,7                 |                   |
| <b>NC</b>     | 2,8                  |                   | 1,4                  |                   | 1,6                  | 0,4                  |                   |
| <b>Total</b>  | 100,0                |                   | 100,0                |                   | 100,0                | 100,0                |                   |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja actual; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de parejas pasadas; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

IC= Intervalo de confianza

Si se tiene en cuenta exclusivamente a las mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual de la pareja (Tabla 14.15), el porcentaje de mujeres que afirma haber tenido consecuencias psicológicas derivadas de los episodios de violencia es mayor: 82,6% para

cualquier pareja, 64,0% para la violencia física o sexual de la pareja actual y 84,2% para la violencia física o sexual de parejas pasadas.

Tabla 14.15 Consecuencias psicológicas de los episodios de violencia física o sexual de alguna pareja

|               | Pareja actual        |                   | Parejas pasadas      |                   | Cualquier pareja     |                   |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|               | % <sup>1</sup>       | Número de mujeres | % <sup>2</sup>       | Número de mujeres | % <sup>3</sup>       | Número de mujeres |
| <b>Sí</b>     | <b>64,0</b>          | <b>263.164</b>    | <b>84,2</b>          | <b>2.002.468</b>  | <b>82,6</b>          | <b>2.224.952</b>  |
| <b>IC 95%</b> | <b>(57,1 - 70,4)</b> |                   | <b>(82,0 - 86,3)</b> |                   | <b>(80,5 - 84,6)</b> |                   |
| <b>No</b>     | 33,6                 |                   | 14,6                 |                   | 16,0                 |                   |
| <b>NC</b>     | 2,4                  |                   | 1,2                  |                   | 1,4                  |                   |
| <b>Total</b>  | 100,0                |                   | 100,0                |                   | 100,0                |                   |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física o sexual de la pareja actual; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física o sexual de parejas pasadas; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física o sexual de cualquier pareja.

IC= Intervalo de confianza

La consecuencia psicológica más citada es la pérdida de autoestima, mencionada por el 54,0% de las mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja (Tabla 14.16). Le siguen la desesperación y la sensación de impotencia (mencionada por el 41,8% de quienes han sufrido VFSEM de alguna pareja), los problemas de sueño o alimentación (39,0%) y la ansiedad, fobias o ataques de pánico (37,9%).

Si se observa lo que sucede entre las que han sufrido violencia física o sexual, aumenta el porcentaje de quienes citan cada consecuencia (Tabla 14.16). Por ejemplo, el 38,7% de quienes han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja afirma que sufrió depresión, el 48,5% ansiedad, el 64,1% pérdida de autoestima y el 50,5% desesperación.

Tabla 14.16 Consecuencias psicológicas de los episodios de violencia de la pareja, por tipo de consecuencia\*

|                                                    | Pareja actual<br>(VFSEM)^ |                   | Parejas pasadas<br>(VFSEM)^ |                   | Cualquier pareja<br>(VFSEM)^ |                   | Cualquier pareja<br>(VF o VS)^ |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                    | % <sup>1</sup>            | Número de mujeres | % <sup>2</sup>              | Número de mujeres | % <sup>3</sup>               | Número de mujeres | % <sup>4</sup>                 | Número de mujeres |
| Depresión                                          | 13,9                      | 181.086           | 32,4                        | 1.306.798         | 29,5                         | 1.446.522         | 38,7                           | 1.042.293         |
| Pérdida de autoestima                              | 31,5                      | 409.556           | 58,3                        | 2.354.144         | 54,0                         | 2.649.691         | 64,1                           | 1.726.328         |
| Ansiedad, fobias, ataques de pánico                | 18,6                      | 242.109           | 41,8                        | 1.686.887         | 37,9                         | 1.858.654         | 48,5                           | 1.305.496         |
| Desesperación, sensación de impotencia             | 30,8                      | 400.748           | 43,2                        | 1.744.928         | 41,8                         | 2.048.464         | 50,5                           | 1.360.533         |
| Problemas de concentración, falta de memoria       | 12,0                      | 156.584           | 21,8                        | 880.961           | 20,4                         | 998.930           | 26,8                           | 721.645           |
| Problemas de sueño o alimentación                  | 24,2                      | 315.128           | 41,6                        | 1.680.034         | 39                           | 1.914.500         | 49,4                           | 1.330.007         |
| Dolor recurrente en algunas partes del cuerpo      | 4,6                       | 60.186            | 13,1                        | 526.949           | 11,7                         | 573.850           | 16,3                           | 437.551           |
| Autolesionarse/pensamientos o intentos de suicidio | 2,1                       | 27.512            | 8,2                         | 329.565           | 7,1                          | 347.771           | 11,8                           | 318.553           |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja actual; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de parejas pasadas; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja.

\* Pregunta de respuesta múltiple.

^ VFSEM= violencia física, sexual, emocional o miedo; VF o VS= violencia física o sexual

## 14.5 Consumo de sustancias para afrontar los episodios de violencia en la pareja

El 25,1% de las mujeres que han sufrido VFSEM de una pareja o expareja han consumido alguna sustancia (medicamentos, alcohol o drogas) para afrontar lo sucedido (Tabla 14.17). Suponen el 5,8% de las mujeres residentes en España de 16 o más años (1.229.676 mujeres). Si solo se tiene en cuenta a las que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, una de cada tres (32,9%) ha consumido alguna sustancia para afrontar lo sucedido<sup>6</sup>.

Tabla 14.17 Consumo de sustancias para afrontar los episodios de violencia (VFSEM) de la pareja

|               | Pareja actual        |                   | Parejas pasadas      |                   | Cualquier pareja     | Total de mujeres   | Número de mujeres |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|               | % <sup>1</sup>       | Número de mujeres | % <sup>2</sup>       | Número de mujeres | % <sup>3</sup>       | % <sup>4</sup>     |                   |
| <b>Sí</b>     | <b>14,0</b>          | <b>181.522</b>    | <b>27,4</b>          | <b>1.103.920</b>  | <b>25,1</b>          | <b>5,8</b>         | <b>1.229.676</b>  |
| <b>IC 95%</b> | <b>(11,4 - 16,8)</b> |                   | <b>(25,4 - 29,4)</b> |                   | <b>(23,4 - 26,9)</b> | <b>(5,3 - 6,2)</b> |                   |
| <b>No</b>     | 85,1                 |                   | 71,2                 |                   | 73,5                 | 93,9               |                   |
| <b>NC</b>     | 0,9                  |                   | 1,5                  |                   | 1,4                  | 0,3                |                   |
| <b>Total</b>  | 100,0                |                   | 100,0                |                   | 100,0                | 100,0              |                   |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja actual; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de parejas pasadas; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

IC= Intervalo de confianza

Por tipo de sustancia (Tabla 14.18), lo más frecuente es el consumo de medicamentos (20,0% de las que han sufrido VFSEM de alguna pareja, y un porcentaje ligeramente mayor, 26,3%, entre las que han sufrido violencia física o sexual). El 6,1% de las mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja afirman haber consumido alcohol para afrontar lo sucedido y el 2,7%, drogas.

Tabla 14.18 Consumo de sustancias para afrontar los episodios de violencia de la pareja, por tipo de sustancia\*

|              | Pareja actual<br>(VFSEM)^ |                   | Parejas pasadas<br>(VFSEM)^ |                   | Cualquier pareja<br>(VFSEM)^ |                   | Cualquier pareja<br>(VF o VS)^ |                   |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|              | % <sup>1</sup>            | Número de mujeres | % <sup>2</sup>              | Número de mujeres | % <sup>3</sup>               | Número de mujeres | % <sup>4</sup>                 | Número de mujeres |
| Medicamentos | 11,6                      | 150.380           | 21,5                        | 867.888           | 20,0                         | 980.695           | 26,3                           | 707.281           |
| Alcohol      | 3,2                       | 41.258            | 6,8                         | 275.723           | 6,1                          | 297.093           | 7,9                            | 213.277           |
| Drogas       | .                         | .                 | 3,3                         | 132.463           | 2,7                          | 134.671           | 4,3                            | 116.481           |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja actual; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de parejas pasadas; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja.

\* Pregunta de respuesta múltiple.

^ VFSEM= violencia física, sexual, emocional o miedo; VF o VS= violencia física o sexual

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

<sup>6</sup> Resultados no mostrados en tabla.

## 14.6 Discapacidad como consecuencia de la violencia en la pareja

A aquellas mujeres que al comienzo del cuestionario han dicho que tienen un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% o un problema de salud crónico que las limita para realizar actividades cotidianas que la gente hace con normalidad, y que han sufrido VFSEM de su pareja actual o de sus parejas pasadas, se les preguntaba si la discapacidad o limitaciones que tienen son consecuencia de los episodios de violencia sufridos (Tabla 14.19). El 16,4% (204.771) de las mujeres con discapacidad o limitaciones que han sufrido VFSEM de alguna pareja afirman que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas por sus parejas (7,4% entre las que la han padecido de la pareja actual y 18,0% en el caso de la violencia de parejas pasadas). Entre las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, un porcentaje ligeramente superior, el 19,6%, afirma que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas por sus parejas.

Si se analiza<sup>7</sup> la existencia de discapacidad o limitaciones como consecuencia de la violencia de la pareja en función del grado de discapacidad o de la severidad de las limitaciones, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre las distintas categorías.

Tabla 14.19 Discapacidad o limitaciones como consecuencia de la violencia de la pareja

|               | Pareja actual<br>(VFSEM)^ |                   | Parejas pasadas<br>(VFSEM)^ |                   | Cualquier pareja<br>(VFSEM)^ |                   | Cualquier pareja<br>(VF o VS)^ |                   |
|---------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|               | % <sup>1</sup>            | Número de mujeres | % <sup>2</sup>              | Número de mujeres | % <sup>3</sup>               | Número de mujeres | % <sup>4</sup>                 | Número de mujeres |
| <b>Sí</b>     | <b>7,4</b>                | <b>25.674</b>     | <b>18,0</b>                 | <b>181.720</b>    | <b>16,4</b>                  | <b>204.771</b>    | <b>19,6</b>                    | <b>146.646</b>    |
| <b>IC 95%</b> | <b>(4,1 - 12,1)</b>       |                   | <b>(14,7 - 21,6)</b>        |                   | <b>(13,6 - 19,5)</b>         |                   | <b>(15,8 - 24,0)</b>           |                   |
| <b>No</b>     | 90,3                      |                   | 77,9                        |                   | 80,0                         |                   | 75,9                           |                   |
| <b>NC</b>     | 2,4                       |                   | 4,1                         |                   | 3,7                          |                   | 4,4                            |                   |
| <b>Total</b>  | 100,0                     |                   | 100,0                       |                   | 100,0                        |                   | 100,0                          |                   |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres con discapacidad o limitaciones que han sufrido VFSEM de la pareja actual; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres con discapacidad o limitaciones que han sufrido VFSEM de parejas pasadas; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres con discapacidad o limitaciones que han sufrido VFSEM de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres con discapacidad o limitaciones que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja.

^ VFSEM= violencia física, sexual, emocional o miedo; VF o VS= violencia física o sexual

IC= Intervalo de confianza

El símbolo "''" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

## 14.7 Absentismo laboral como consecuencia de la violencia en la pareja

El 12,9% (Tabla 14.20) de las mujeres que han sufrido VFSEM de una pareja o expareja estuvieron una época sin poder acudir a su lugar de trabajo o estudio como consecuencia de los episodios de violencia (4,6% entre las que han padecido la violencia de la pareja actual y 14,4% en el caso de la violencia de parejas pasadas). En el caso de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja o expareja el porcentaje de quienes estuvieron una época sin poder

<sup>7</sup> Resultados no mostrados en tabla.

acudir a su lugar de trabajo o estudio como consecuencia de los episodios de violencia es algo mayor (18,5%).

Tabla 14.20 Absentismo laboral debido a la violencia de la pareja

|                                                 | Pareja actual<br>(VFSEM)^ |                   | Parejas pasadas<br>(VFSEM)^ |                   | Cualquier pareja<br>(VFSEM)^ |                   | Cualquier pareja<br>(VF o VS)^ |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                 | % <sup>1</sup>            | Número de mujeres | % <sup>2</sup>              | Número de mujeres | % <sup>3</sup>               | Número de mujeres | % <sup>4</sup>                 | Número de mujeres |
| <b>Sí</b>                                       | <b>4,6</b>                | <b>60.347</b>     | <b>14,4</b>                 | <b>581.886</b>    | <b>12,9</b>                  | <b>633.254</b>    | <b>18,5</b>                    | <b>497.921</b>    |
| <b>IC 95%</b>                                   | <b>(3,2 - 6,5)</b>        |                   | <b>(12,9 - 16,0)</b>        |                   | <b>(11,6 - 14,3)</b>         |                   | <b>(16,4 - 20,7)</b>           |                   |
| <b>No</b>                                       | 88,7                      |                   | 76,2                        |                   | 77,7                         |                   | 70,3                           |                   |
| <b>En ese momento no trabajaba/no estudiaba</b> | 6,0                       |                   | 8,0                         |                   | 8,1                          |                   | 9,8                            |                   |
| <b>NC</b>                                       | 0,7                       |                   | 1,3                         |                   | 1,3                          |                   | 1,5                            |                   |
| <b>Total</b>                                    | 100,0                     |                   | 100,0                       |                   | 100,0                        |                   | 100,0                          |                   |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja actual; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de parejas pasadas; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja.

^ VFSEM= violencia física, sexual, emocional o miedo; VF o VS= violencia física o sexual

IC= Intervalo de confianza

## 14.8 Secuelas de la violencia de la pareja

El 43,1% (1.603.415) de las mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja y han tenido lesiones físicas o consecuencias psicológicas tras los episodios de violencia, afirman que en la actualidad siguen teniendo secuelas físicas o psicológicas como consecuencia de la violencia, siendo el porcentaje bastante superior entre quienes sufrieron violencia de parejas pasadas (44,9%) que entre quienes la han padecido de la pareja actual (27,5%). Suponen el 7,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años (Tabla 14.21).

Tabla 14.21 Secuelas físicas y/o psicológicas en la actualidad como consecuencia de la VFSEM de alguna pareja

|               | Pareja actual        |                   | Parejas pasadas      |                   | Cualquier pareja     | Total de mujeres   | Número de mujeres |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|               | % <sup>1</sup>       | Número de mujeres | % <sup>2</sup>       | Número de mujeres | % <sup>3</sup>       | % <sup>4</sup>     |                   |
| <b>Sí</b>     | <b>27,5</b>          | <b>200.584</b>    | <b>44,9</b>          | <b>1.440.416</b>  | <b>43,1</b>          | <b>7,5</b>         | <b>1.603.415</b>  |
| <b>IC 95%</b> | <b>(23,0 - 32,3)</b> |                   | <b>(42,5 - 47,4)</b> |                   | <b>(40,8 - 45,4)</b> | <b>(7,0 - 8,1)</b> |                   |
| <b>No</b>     | 65,9                 |                   | 52,0                 |                   | 52,9                 | 91,8               |                   |
| <b>NC</b>     | 6,6                  |                   | 3,1                  |                   | 3,9                  | 0,7                |                   |
| <b>Total</b>  | 100,0                |                   | 100,0                |                   | 100,0                | 100,0              |                   |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja actual y tuvieron lesiones o consecuencias psicológicas tras los episodios de violencia; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de parejas pasadas y tuvieron lesiones o consecuencias psicológicas tras los episodios de violencia; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de alguna pareja y tuvieron lesiones o consecuencias psicológicas tras los episodios de violencia; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres residentes en España de 16 o más años.

IC= Intervalo de confianza

De las mujeres que afirman tener secuelas en la actualidad derivadas de los episodios de violencia, la mayor parte (84,4% parejas pasadas, 87,9% pareja actual) dicen que sus secuelas

son psicológicas. En el caso de la violencia de parejas pasadas, el 8,1% de quienes tienen secuelas dicen que estas son tanto físicas como psicológicas, y un 7,6% afirman tener exclusivamente secuelas físicas (Tabla 14.22).

*Tabla 14.22 Secuelas físicas y/o psicológicas en la actualidad como consecuencia de la VFSEM de alguna pareja, desagregado por tipo de secuela*

|                                 | Pareja actual  |                   | Parejas pasadas |                   |
|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                 | % <sup>1</sup> | Número de mujeres | % <sup>2</sup>  | Número de mujeres |
| Secuelas físicas                | .              | .                 | 7,6             | 108.930           |
| Secuelas psicológicas           | 87,9           | 176.346           | 84,4            | 1.215.365         |
| Secuelas físicas y psicológicas | 8,2            | 16.516            | 8,1             | 116.122           |
| Total                           | 100,0          | 200.584           | 100,0           | 1.440.416         |

1. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja actual y afirman tener secuelas de los episodios de violencia; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido VFSEM de parejas pasadas y afirman tener secuelas de los episodios de violencia.

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

El símbolo '""' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

## 14.9 Impacto de la violencia de la pareja en la salud, la asistencia a servicios sanitarios, el consumo de sustancias y la percepción de inseguridad

En este apartado se analiza el impacto de la violencia de la pareja en la salud, la asistencia a servicios sanitarios, el consumo de sustancias y la percepción de inseguridad de las mujeres afectadas. Para ello se compara la respuesta a determinadas preguntas de las mujeres que han sufrido violencia de la pareja con la de las mujeres que nunca la han sufrido. Estas preguntas se formulaban al comienzo<sup>8</sup> del cuestionario y se realizaban a todas las mujeres entrevistadas. Por ello, es posible comparar las respuestas de las que han sufrido violencia con las de quienes no la han sufrido. Aunque en un sentido estricto no pueda hablarse de una relación de causalidad y aunque haya otras variables que puedan estar influyendo en el resultado, las diferencias en las respuestas a estas preguntas entre las que han padecido violencia y las que no, se consideran relevantes para mostrar el impacto de este tipo de violencia en la vida de las mujeres afectadas.

Como se ha dicho anteriormente, las preguntas que se analizan en este apartado se hacían a todas las entrevistadas, por lo que en las tablas de este epígrafe en "cualquier tipo de violencia de la pareja" quedan englobadas la violencia física, la sexual, la emocional y el miedo, pero también la violencia de control y la económica. De todas formas, en las tablas siguientes se muestran los resultados, además de para las mujeres que han sufrido cualquier forma de violencia de la pareja (física, sexual, emocional, de control, económica, y miedo), para aquellas que han padecido violencia física, sexual, emocional o miedo, independientemente de que hayan o no sufrido violencia económica o de control<sup>9</sup>, y también para las que han sufrido violencia física y/o sexual (independientemente de que hayan o no sufrido violencia emocional, económica, de control o miedo). Se verá cómo, en general, en estos dos grupos de mujeres y especialmente entre las que han sufrido violencia física y/o sexual, es considerablemente mayor el porcentaje

<sup>8</sup> Con el objetivo de evitar que las preguntas sobre violencia pudiesen influir en las respuestas.

<sup>9</sup> Por ser las que se han empleado en los capítulos previos sobre denuncia, búsqueda de ayuda, etc.

de mujeres que sufren mala salud, consumen algún tipo de sustancia, tienen pensamientos de suicidio, o una mayor percepción de inseguridad. Aunque no es el objeto de este estudio profundizar en ello, cabe mencionar que esto puede deberse tanto a una mayor gravedad de los actos de violencia padecidos por estas mujeres como a la mayor acumulación<sup>10</sup> de tipos de violencia sufridos.

#### 14.9.1 Estado de salud autopercebido y síntomas de mala salud sufridos con frecuencia en los 12 meses previos a las entrevistas

Con respecto al estado de salud autopercebido (Tabla 14.23), las mujeres que han sufrido violencia de la pareja en algún momento de sus vidas presentan un peor estado de salud que las que no han sufrido violencia. Por ejemplo, mientras que el 25,9% de las que no han sufrido violencia de la pareja afirman que su estado de salud es muy bueno, este porcentaje es diez puntos inferior (15,8%) entre las que han sufrido violencia de la pareja. De la misma forma, entre las que no han sufrido violencia de la pareja, el 5,0% dicen que su estado de salud es malo y el 1,6% muy malo, porcentajes que ascienden al 8,1% y 4,1% respectivamente entre las que han sufrido violencia de la pareja. Por otro lado, se observa cómo el estado de salud es ligeramente peor entre las que han sufrido violencia física o sexual, o VFSEM.

Tabla 14.23 Estado de salud autopercebido en los 12 meses previos a las entrevistas

| En los últimos doce meses, ¿diría Ud. que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo? |                                        |                                             |                                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                  | Violencia física o sexual de la pareja | Violencia física, sexual, emocional o miedo | Cualquier tipo de violencia de la pareja | Ningún tipo de violencia de la pareja |
|                                                                                                                  | % <sup>1</sup> columna                 | % <sup>2</sup> columna                      | % <sup>3</sup> columna                   | % <sup>4</sup> columna                |
| <b>Muy bueno</b>                                                                                                 | 13,2                                   | 14,5                                        | 15,8                                     | 25,9                                  |
| <b>Bueno</b>                                                                                                     | 37,5                                   | 38,9                                        | 40,4                                     | 44,5                                  |
| <b>Regular</b>                                                                                                   | 34,8                                   | 32,7                                        | 31,5                                     | 22,7                                  |
| <b>Malo</b>                                                                                                      | 8,6                                    | 8,8                                         | 8,1                                      | 5,0                                   |
| <b>Muy malo</b>                                                                                                  | 5,6                                    | 4,8                                         | 4,1                                      | 1,6                                   |
| <b>NC</b>                                                                                                        | .                                      | 0,2                                         | 0,2                                      | 0,3                                   |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (incluyendo la violencia económica y la de control) de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre mujeres que no han sufrido violencia de la pareja.

**p<0,001.** El contraste X2 se ha hecho entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y las que no han sufrido ningún tipo de violencia de la pareja.

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

El símbolo '0' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

El cuestionario también preguntaba por síntomas de mala salud que la mujer haya tenido con frecuencia en los 12 meses previos a las entrevistas (Tabla 14.24). Las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja en algún momento de sus vidas han padecido los distintos síntomas en bastante mayor medida que las mujeres que nunca han sufrido violencia de la

<sup>10</sup> Una mujer víctima de violencia física o sexual, tal y como se ha visto en capítulos previos, suele sufrir también algún tipo de violencia psicológica. En cambio, la mayor parte de las mujeres víctimas de violencia psicológica de control, no han sufrido violencia física ni sexual.

pareja. Por ejemplo, mientras que solo el 7,3% de las mujeres que nunca han sufrido violencia de la pareja han experimentado “Tristeza porque pensaba que no valía nada”, el porcentaje asciende hasta el 22,2% entre las que han padecido cualquier tipo de violencia de la pareja y hasta el 28,8% entre quienes han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja. De la misma forma, entre las mujeres que nunca han sufrido violencia de la pareja el 11,7% afirman haber sufrido irritabilidad con frecuencia en el último año y el 21,1%, ansiedad. Estos porcentajes ascienden al 29,6% y 48,1% respectivamente entre las que han padecido cualquier tipo de violencia de la pareja, y al 34,0% y 55,5% respectivamente entre las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja.

Tabla 14.24 Síntomas de mala salud que se han tenido con frecuencia en los 12 meses previos a las entrevistas

De los siguientes síntomas, ¿cuáles de ellos ha tenido Ud., con cierta frecuencia, durante los últimos doce meses?\*

|                                                     | Violencia física o sexual de la pareja | Violencia física, sexual, emocional o miedo | Cualquier tipo de violencia de la pareja | Ningún tipo de violencia de la pareja |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                     | % <sup>1</sup>                         | % <sup>2</sup>                              | % <sup>3</sup>                           | % <sup>4</sup>                        |
| <b>Insomnio, falta de sueño+++</b>                  | 51,5                                   | 48,4                                        | 46,7                                     | 27,2                                  |
| <b>Fatiga permanente+++</b>                         | 31,5                                   | 29,0                                        | 26,6                                     | 12,4                                  |
| <b>Cambios de ánimo+++</b>                          | 48,1                                   | 45,4                                        | 42,9                                     | 20,3                                  |
| <b>Irritabilidad+++</b>                             | 34,0                                   | 31,6                                        | 29,6                                     | 11,7                                  |
| <b>Tristeza porque pensaba que no valía nada+++</b> | 28,8                                   | 25,2                                        | 22,2                                     | 7,3                                   |
| <b>Ganas de llorar sin motivos+++</b>               | 32,7                                   | 29,5                                        | 26,6                                     | 11,2                                  |
| <b>Ansiedad o angustia+++</b>                       | 55,5                                   | 51,3                                        | 48,1                                     | 21,1                                  |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (incluyendo la violencia económica y la de control) de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre mujeres que no han sufrido violencia de la pareja.

\* Para cada síntoma solo se muestra el porcentaje de las que responden que lo han tenido (sí) sobre el total. No se muestran los porcentajes de “no” y “NC”.

+++  $p < 0,001$ . Los contrastes X2 se han hecho entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y las que no han sufrido ningún tipo de violencia de la pareja.

#### 14.9.2 Asistencia a servicios sanitarios en los 12 meses previos a las entrevistas

La violencia en la pareja tiene consecuencias en la salud de las mujeres afectadas que perduran en el tiempo y esto hace que asistan con mayor frecuencia a diversos servicios de atención sanitaria, aunque los episodios de esa violencia hayan sucedido en el pasado (Tabla 14.25). Por ejemplo, entre las mujeres que nunca han sufrido violencia de la pareja el 10,2% ha acudido en el último año a un servicio de atención psicológica o psiquiátrica, y el 30,9% han hecho uso de un servicio de urgencias. Estos porcentajes ascienden al 26,0% y 48,2% respectivamente entre las que han padecido cualquier tipo de violencia de la pareja, y al 32,6% y 53,5% respectivamente entre las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja.

Además, mientras que el 27,0% de las mujeres que nunca han sufrido violencia de la pareja afirman que en el año previo a las entrevistas se han visto obligadas a quedarse algún día en la cama por motivos de salud, entre las que han padecido cualquier tipo de violencia de la pareja

este porcentaje es del 45,0% y asciende al 49,2% entre las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja (Tabla 14.25).

Tabla 14.25 Asistencia a servicios sanitarios en los 12 meses previos a las entrevistas

| En los últimos doce meses...*                                                                                     |                                        |                                             |                                          |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                   | Violencia física o sexual de la pareja | Violencia física, sexual, emocional o miedo | Cualquier tipo de violencia de la pareja | Ningún tipo de violencia de la pareja |
|                                                                                                                   | % <sup>1</sup>                         | % <sup>2</sup>                              | % <sup>3</sup>                           | % <sup>4</sup>                        |
| Se ha visto obligada a quedarse algún día en la cama por motivos de salud+++                                      | 49,2                                   | 46,7                                        | 45,0                                     | 27,0                                  |
| Ha acudido a un centro de salud, o médico general por motivos de su propia salud+++                               | 84,7                                   | 84,1                                        | 82,7                                     | 74,7                                  |
| Ha ingresado como paciente en un hospital al menos durante una noche (excluyendo partos o cesáreas) <sup>ns</sup> | 13,9                                   | 12,3                                        | 11,5                                     | 10,3                                  |
| Ha utilizado algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad suyo+++                                  | 53,5                                   | 50,2                                        | 48,2                                     | 30,9                                  |
| Ha visitado para sí misma a un psicólogo/a, psicoterapeuta o psiquiatra+++                                        | 32,6                                   | 29,1                                        | 26,0                                     | 10,2                                  |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (incluyendo la violencia económica y la de control) de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre mujeres que no han sufrido violencia de la pareja.

\* Para cada ítem solo se muestra el porcentaje de las que responden "sí" sobre el total. No se muestran los porcentajes de "no" y "NC".

+++  $p < 0,001$ , ns= no significativo. Los contrastes X<sup>2</sup> se han hecho entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y las que no han sufrido ningún tipo de violencia de la pareja.

### 14.9.3 Pensamientos e intentos de suicidio

Las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja han tenido pensamientos de suicidio (18,4%) en bastante mayor medida que las que no han sufrido violencia (4,2%). La diferencia es especialmente acusada con respecto a las que han sufrido violencia física o sexual ya que el 26,7% de estas mujeres afirman haber tenido pensamientos de suicidio (Tabla 14.26). Esto implica que la probabilidad de haber tenido pensamientos de suicidio es 4 veces mayor entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y 6 veces mayor entre las que han padecido violencia física o sexual de la pareja que entre las que nunca han sufrido violencia de la pareja.

Tabla 14.26 Pensamientos de suicidio alguna vez en la vida

|           | Violencia física o sexual de la pareja |                   | Violencia física, sexual, emocional o miedo |                   | Cualquier tipo de violencia de la pareja |                   | Ningún tipo de violencia de la pareja |                   |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
|           | % <sup>1</sup>                         | Número de mujeres | % <sup>2</sup>                              | Número de mujeres | % <sup>3</sup>                           | Número de mujeres | % <sup>4</sup>                        | Número de mujeres |
| <b>Sí</b> | 26,7                                   | 719.096           | 21,4                                        | 1.049.748         | 18,4                                     | 1.185.499         | 4,2                                   | 606.909           |
| <b>No</b> | 69,8                                   |                   | 74,9                                        |                   | 78,3                                     |                   | 94,8                                  |                   |
| <b>NC</b> | 3,5                                    |                   | 3,7                                         |                   | 3,3                                      |                   | 0,9                                   |                   |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (incluyendo la violencia económica y la de control) de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre mujeres que no han sufrido violencia de la pareja.

$p < 0,001$ . El contraste X<sup>2</sup> se ha hecho entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y las que no han sufrido ningún tipo de violencia de la pareja.

Algo similar sucede con los pensamientos de suicidio en los últimos 12 meses (Tabla 14.27): el 1,1% de las mujeres que nunca han sufrido violencia de la pareja han tenido pensamientos de suicidio en los 12 meses previos a las entrevistas. Este porcentaje asciende al 6,4% entre las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja a lo largo de sus vidas, y al 9,3% entre las que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja a lo largo de sus vidas. Es decir, la probabilidad de tener pensamientos de suicidio en la actualidad es casi 6 veces mayor entre las que han sufrido violencia de la pareja y casi 9 veces mayor entre las que han padecido violencia física o sexual de la pareja comparadas con las que nunca han sufrido violencia de la pareja.

Tabla 14.27 Pensamientos de suicidio en los 12 meses previos a las entrevistas

|           | Violencia física o sexual de la pareja |                   | Violencia física, sexual, emocional o miedo |                   | Cualquier tipo de violencia de la pareja |                   | Ningún tipo de violencia de la pareja |                   |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
|           | % <sup>1</sup>                         | Número de mujeres | % <sup>2</sup>                              | Número de mujeres | % <sup>3</sup>                           | Número de mujeres | % <sup>4</sup>                        | Número de mujeres |
| <b>Sí</b> | 9,3                                    | 251.394           | 7,4                                         | 364.558           | 6,4                                      | 409.952           | 1,1                                   | 155.520           |
| <b>No</b> | 90,3                                   |                   | 92,2                                        |                   | 93,3                                     |                   | 98,8                                  |                   |
| <b>NC</b> | 0,4                                    |                   | 0,4                                         |                   | 0,3                                      |                   | 0,1                                   |                   |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (incluyendo la violencia económica y la de control) de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre mujeres que no han sufrido violencia de la pareja.

$p < 0,001$ . El contraste X<sup>2</sup> se ha hecho entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y las que no han sufrido ningún tipo de violencia de la pareja.

El símbolo "0,4" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

El cuestionario también preguntaba si en alguna ocasión los pensamientos de suicidio han acabado en intentos (Tabla 14.28): el 0,9% de las mujeres que nunca han sufrido violencia de la pareja han tenido intentos de suicidio en algún momento de sus vidas. Este porcentaje asciende al 5,7% entre las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja, y al 9,6% entre las que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja. Es decir, la probabilidad de haber tenido intentos de suicidio es 6 veces mayor entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia

de la pareja y casi 11 veces mayor entre las que han padecido violencia física o sexual de la pareja que entre las que nunca han sufrido violencia de la pareja.

Tabla 14.28 Intentos de suicidio alguna vez en la vida

|           | Violencia física o sexual de la pareja |                   | Violencia física, sexual, emocional o miedo |                   | Cualquier tipo de violencia de la pareja |                   | Ningún tipo de violencia de la pareja |                   |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
|           | % <sup>1</sup>                         | Número de mujeres | % <sup>2</sup>                              | Número de mujeres | % <sup>3</sup>                           | Número de mujeres | % <sup>4</sup>                        | Número de mujeres |
| <b>Sí</b> | 9,6                                    | 257.497           | 6,8                                         | 333.952           | 5,7                                      | 369.248           | 0,9                                   | 127.378           |
| <b>No</b> | 89,5                                   |                   | 92,5                                        |                   | 93,6                                     |                   | 99,0                                  |                   |
| <b>NC</b> | 1,0                                    |                   | 0,7                                         |                   | 0,6                                      |                   | 0,1                                   |                   |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (incluyendo la violencia económica y la de control) de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre mujeres que no han sufrido violencia de la pareja.

$p < 0,001$ . El contraste X<sup>2</sup> se ha hecho entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y las que no han sufrido ningún tipo de violencia de la pareja.

El símbolo "''" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

#### 14.9.4 Consumo de medicamentos y sustancias (tabaco, alcohol, marihuana y otras drogas)

##### 14.9.4.1 Consumo de medicamentos

Las mujeres víctimas de violencia en la pareja consumen en la actualidad medicamentos (ansiolíticos, antidepresivos o analgésicos) en mayor medida que las que nunca han padecido esta violencia (Tabla 14.29): el 20,4% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja y el 16,3% de las mujeres que han sufrido cualquier forma de violencia de la pareja a lo largo de sus vidas han consumido antidepresivos en los 12 meses previos a las entrevistas, frente al 8,0% de las que nunca han sufrido violencia de la pareja. El 28,3% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja y el 24,9% de las mujeres que han sufrido cualquier forma de violencia de la pareja a lo largo de sus vidas han consumido ansiolíticos en los 12 meses previos a las entrevistas, frente al 15,2% de las que nunca han sufrido violencia de la pareja.

Tabla 14.29 Consumo de medicamentos en los 12 meses previos a las entrevistas

| Durante los últimos doce meses, ¿ha consumido alguno de los siguientes medicamentos, con o sin receta médica?* |                                        |                                             |                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                | Violencia física o sexual de la pareja | Violencia física, sexual, emocional o miedo | Cualquier tipo de violencia de la pareja | Ningún tipo de violencia de la pareja |
|                                                                                                                | % <sup>1</sup>                         | % <sup>2</sup>                              | % <sup>3</sup>                           | % <sup>4</sup>                        |
| <b>Tranquilizantes o sedantes+++</b>                                                                           | 28,3                                   | 26,8                                        | 24,9                                     | 15,2                                  |
| <b>Antidepresivos+++</b>                                                                                       | 20,4                                   | 18,5                                        | 16,3                                     | 8,0                                   |
| <b>Analgésicos+++</b>                                                                                          | 66,2                                   | 65,2                                        | 64,8                                     | 59,3                                  |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (incluyendo la violencia económica y la de control) de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre mujeres que no han sufrido violencia de la pareja.

\* Para cada ítem solo se muestra el porcentaje de las que responden "sí" sobre el total. No se muestran los porcentajes de "no" y "NC".

+++  $p < 0,001$ . Los contrastes X2 se han hecho entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y las que no han sufrido ningún tipo de violencia de la pareja.

#### 14.9.4.2 Consumo de tabaco o cigarrillos electrónicos

Las mujeres víctimas de violencia en la pareja consumen en la actualidad tabaco o cigarrillos electrónicos en mayor medida que las que nunca han padecido esta violencia (Tabla 14.30): el 34,9% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja y el 32,0% de las mujeres que han sufrido cualquier forma de violencia de la pareja a lo largo de sus vidas han consumido tabaco o cigarrillos electrónicos en los 12 meses previos a las entrevistas, frente al 16,1% de las que nunca han sufrido violencia de la pareja. Las diferencias entre las que han padecido violencia en la pareja y las que no en lo relativo a la frecuencia<sup>11</sup> del consumo de tabaco o cigarrillos electrónicos de aquellas que han fumado en alguna ocasión en los últimos 12 meses, aunque estadísticamente significativas, son pequeñas en términos de diferencias porcentuales, solo siendo relevante el mayor porcentaje de consumo esporádico entre las víctimas de violencia en la pareja (18,6%) que entre las no víctimas (13,0%).

Tabla 14.30 Consumo de tabaco o cigarrillos electrónicos en los 12 meses previos a las entrevistas

|           | Violencia física o sexual de la pareja |                   | Violencia física, sexual, emocional o miedo |                   | Cualquier tipo de violencia de la pareja |                   | Ningún tipo de violencia de la pareja |                   |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
|           | % <sup>1</sup>                         | Número de mujeres | % <sup>2</sup>                              | Número de mujeres | % <sup>3</sup>                           | Número de mujeres | % <sup>4</sup>                        | Número de mujeres |
| <b>Sí</b> | 34,9                                   | 939.675           | 34,2                                        | 1.678.580         | 32,0                                     | 2.063.259         | 16,1                                  | 2.312.531         |
| <b>No</b> | 64,8                                   |                   | 65,4                                        |                   | 67,5                                     |                   | 83,5                                  |                   |
| <b>NC</b> | .                                      |                   | 0,4                                         |                   | 0,5                                      |                   | 0,3                                   |                   |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (incluyendo la violencia económica y la de control) de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre mujeres que no han sufrido violencia de la pareja.

$p < 0,001$ . El contraste X2 se ha hecho entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y las que no han sufrido ningún tipo de violencia de la pareja.

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

El símbolo '""' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

<sup>11</sup> Resultados no mostrados en tabla.

## 14.9.4.3 Consumo de bebidas alcohólicas

Las mujeres víctimas de violencia en la pareja consumen en la actualidad bebidas alcohólicas<sup>12</sup> en mayor medida que las que nunca han padecido esta violencia (Tabla 14.31): el 68,2% de las mujeres que han sufrido cualquier forma de violencia de la pareja a lo largo de sus vidas han consumido bebidas alcohólicas en los 12 meses previos a las entrevistas, frente al 50,1% de las que nunca han sufrido violencia de la pareja. Las diferencias entre las que han padecido violencia en la pareja y las que no en lo relativo a la frecuencia<sup>13</sup> del consumo de alcohol de aquellas que han bebido en alguna ocasión en los últimos 12 meses, aunque estadísticamente significativas, son muy pequeñas en términos de diferencias porcentuales.

Tabla 14.31 Consumo de bebidas alcohólicas en los 12 meses previos a las entrevistas

|           | Violencia física o sexual de la pareja |                   | Violencia física, sexual, emocional o miedo |                   | Cualquier tipo de violencia de la pareja |                   | Ningún tipo de violencia de la pareja |                   |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
|           | % <sup>1</sup>                         | Número de mujeres | % <sup>2</sup>                              | Número de mujeres | % <sup>3</sup>                           | Número de mujeres | % <sup>4</sup>                        | Número de mujeres |
| <b>Sí</b> | 66,8                                   | 1.797.684         | 68,5                                        | 3.357.709         | 68,2                                     | 4.392.585         | 50,1                                  | 7.185.003         |
| <b>No</b> | 32,7                                   |                   | 31,0                                        |                   | 31,3                                     |                   | 49,0                                  |                   |
| <b>NC</b> | 0,6                                    |                   | 0,5                                         |                   | 0,5                                      |                   | 0,9                                   |                   |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (incluyendo la violencia económica y la de control) de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre mujeres que no han sufrido violencia de la pareja.

$p < 0,001$ . El contraste  $\chi^2$  se ha hecho entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y las que no han sufrido ningún tipo de violencia de la pareja.

El símbolo "NC" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

El cuestionario indagaba también en el posible consumo abusivo<sup>14</sup> de alcohol, entendiendo este como la toma de 4 o más bebidas alcohólicas en un intervalo aproximado de cuatro a seis horas (Tabla 14.32): las mujeres víctimas de violencia en la pareja han abusado del alcohol al menos en una ocasión durante los últimos 12 meses en mayor medida (36,6%) que las que nunca han sufrido violencia de la pareja (16,8%). Las diferencias entre las que han padecido violencia en la pareja y las que no en lo relativo a la frecuencia<sup>15</sup> del consumo abusivo de alcohol en los últimos 12 meses no son estadísticamente significativas.

<sup>12</sup> MOP15 Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha tomado al menos una bebida alcohólica de cualquier tipo (es decir, cerveza, vino, licores, bebidas destiladas y combinados u otras bebidas alcohólicas)?

<sup>13</sup> Resultados no mostrados en tabla.

<sup>14</sup> MOP15a Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha tomado 4 o más bebidas alcohólicas en una misma ocasión? Por "ocasión" entendemos tomar las bebidas en un intervalo aproximado de cuatro a seis horas. No excluya las bebidas alcohólicas tomadas durante las comidas.

<sup>15</sup> Resultados no mostrados en tabla.

Tabla 14.32 Consumo abusivo de bebidas alcohólicas durante los 12 meses previos a las entrevistas

|           | Violencia física o sexual de la pareja |                   | Violencia física, sexual, emocional o miedo |                   | Cualquier tipo de violencia de la pareja |                   | Ningún tipo de violencia de la pareja |                   |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
|           | % <sup>1</sup>                         | Número de mujeres | % <sup>2</sup>                              | Número de mujeres | % <sup>3</sup>                           | Número de mujeres | % <sup>4</sup>                        | Número de mujeres |
| <b>Sí</b> | 36,8                                   | 991.038           | 37,0                                        | 1.812.706         | 36,6                                     | 2.360.257         | 16,8                                  | 2.408.302         |
| <b>No</b> | 63,0                                   |                   | 62,6                                        |                   | 63,0                                     |                   | 83,0                                  |                   |
| <b>NC</b> | .                                      |                   | 0,4                                         |                   | 0,4                                      |                   | 0,2                                   |                   |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (incluyendo la violencia económica y la de control) de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre mujeres que no han sufrido violencia de la pareja.

$p < 0,001$ . El contraste X2 se ha hecho entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y las que no han sufrido ningún tipo de violencia de la pareja.

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

El símbolo '0' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

#### 14.9.4.4 Consumo de otras drogas

Las mujeres víctimas de violencia en la pareja consumen en la actualidad cannabis, marihuana o hachís en mayor medida que las que nunca han padecido esta violencia (Tabla 14.33): el 8,0% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja y el 5,7% de las mujeres que han sufrido cualquier forma de violencia de la pareja a lo largo de sus vidas han consumido cannabis, marihuana o hachís en los 12 meses previos a las entrevistas, frente al 1,2% de las que nunca han sufrido violencia en la pareja. Es decir, la probabilidad de haber consumido cannabis, marihuana o hachís en los 12 meses previos a las entrevistas es casi 5 veces mayor entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y casi 7 veces mayor entre las que han padecido violencia física o sexual de la pareja en comparación con las que nunca han sufrido violencia de la pareja.

Las diferencias entre las que han padecido violencia en la pareja y las que no en lo relativo a la frecuencia<sup>16</sup> del consumo de cannabis, marihuana o hachís de aquellas que lo han consumido en alguna ocasión en los últimos 12 meses, no son estadísticamente significativas.

<sup>16</sup> Resultados no mostrados en tabla.

Tabla 14.33 Consumo de cannabis, marihuana o hachís en los 12 meses previos a las entrevistas

|           | Violencia física o sexual de la pareja |                   | Violencia física, sexual, emocional o miedo |                   | Cualquier tipo de violencia de la pareja |                   | Ningún tipo de violencia de la pareja |                   |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
|           | % <sup>1</sup>                         | Número de mujeres | % <sup>2</sup>                              | Número de mujeres | % <sup>3</sup>                           | Número de mujeres | % <sup>4</sup>                        | Número de mujeres |
| <b>Sí</b> | 8,0                                    | 215.660           | 6,5                                         | 318.194           | 5,7                                      | 364.810           | 1,2                                   | 169.726           |
| <b>No</b> | 91,3                                   |                   | 92,7                                        |                   | 93,5                                     |                   | 98,5                                  |                   |
| <b>NC</b> | 0,7                                    |                   | 0,8                                         |                   | 0,8                                      |                   | 0,3                                   |                   |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (incluyendo la violencia económica y la de control) de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre mujeres que no han sufrido violencia de la pareja.

$p < 0,001$ . El contraste X<sup>2</sup> se ha hecho entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y las que no han sufrido ningún tipo de violencia de la pareja.

El símbolo "''" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

Las mujeres víctimas de violencia en la pareja consumen en la actualidad otras drogas<sup>17</sup> como la cocaína o la heroína en mayor medida que las que nunca han padecido esta violencia (Tabla 14.34): el 2,9% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja y el 2,0% de las mujeres que han sufrido cualquier forma de violencia de la pareja a lo largo de sus vidas han consumido otras drogas en los 12 meses previos a las entrevistas, frente al 0,3% de las que nunca han sufrido violencia en la pareja. Esto implica que la probabilidad de haber consumido alguna de estas drogas en los 12 meses previos a las entrevistas es 6 veces mayor entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y 9 veces mayor entre las que han padecido violencia física o sexual de la pareja que entre las que nunca han sufrido violencia de la pareja.

Las diferencias entre las que han padecido violencia en la pareja y las que no en lo relativo a la frecuencia<sup>18</sup> del consumo de estas drogas de aquellas que las han consumido en alguna ocasión en los últimos 12 meses, no son estadísticamente significativas.

<sup>17</sup> El cuestionario preguntaba por cocaína, heroína, anfetaminas o speed, éxtasis, alucinógenos, metanfetamina, GHB, setas mágicas o psicodélicas, o inhalables volátiles como pegamento o poppers.

<sup>18</sup> Resultados no mostrados en tabla.

Tabla 14.34 Consumo de cocaína, heroína, anfetaminas o speed, éxtasis, alucinógenos, metanfetamina, GHB, setas mágicas o psicodélicas, o inhalables volátiles como pegamento o poppers en los 12 meses previos a las entrevistas

|           | Violencia física o sexual de la pareja |                   | Violencia física, sexual, emocional o miedo |                   | Cualquier tipo de violencia de la pareja |                   | Ningún tipo de violencia de la pareja |                   |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
|           | % <sup>1</sup>                         | Número de mujeres | % <sup>2</sup>                              | Número de mujeres | % <sup>3</sup>                           | Número de mujeres | % <sup>4</sup>                        | Número de mujeres |
| <b>Sí</b> | 2,9                                    | 78.046            | 2,3                                         | 113.443           | 2,0                                      | 129.477           | 0,3                                   | 45.688            |
| <b>No</b> | 96,3                                   |                   | 97,0                                        |                   | 97,4                                     |                   | 99,4                                  |                   |
| <b>NC</b> | 0,8                                    |                   | 0,7                                         |                   | 0,6                                      |                   | 0,3                                   |                   |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (incluyendo la violencia económica y la de control) de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre mujeres que no han sufrido violencia de la pareja.

$p < 0,001$ . El contraste X<sup>2</sup> se ha hecho entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y las que no han sufrido ningún tipo de violencia de la pareja.

El símbolo "''" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

#### 14.9.5 Percepción de inseguridad

Estudios previos han sugerido que sufrir violencia incrementa la percepción de inseguridad. Para poder analizar este aspecto en España, al comienzo del cuestionario, y de forma previa a las preguntas sobre violencia padecida, se les hacía a todas las mujeres entrevistadas la siguiente pregunta:

*¿En algún momento, durante los últimos 12 meses, ha hecho alguna de las siguientes cosas por miedo a ser asaltada, acosada o agredida física o sexualmente?:*

1. Evitar determinadas calles o zonas (como por ejemplo parques o aparcamientos)
2. Evitar estar a solas con alguien conocido porque le produce temor o inseguridad

Con respecto al primer ítem de la pregunta (Tabla 14.35), el relativo a haber evitado determinadas calles o zonas, las mujeres que han sufrido violencia en la pareja responden de forma afirmativa en bastante mayor medida que las que nunca han sufrido violencia de la pareja: el 53,2% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja y el 48,7% de las mujeres que han sufrido cualquier forma de violencia de la pareja a lo largo de sus vidas han evitado determinadas calles o zonas en los 12 meses previos a las entrevistas, frente al 23,7% de las que nunca han sufrido violencia en la pareja.

Tabla 14.35 Se han evitado determinadas calles o zonas en los 12 meses previos a las entrevistas por miedo a ser asaltada, acosada o agredida física o sexualmente

|           | Violencia física o sexual de la pareja |                   | Violencia física, sexual, emocional o miedo |                   | Cualquier tipo de violencia de la pareja |                   | Ningún tipo de violencia de la pareja |                   |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
|           | % <sup>1</sup>                         | Número de mujeres | % <sup>2</sup>                              | Número de mujeres | % <sup>3</sup>                           | Número de mujeres | % <sup>4</sup>                        | Número de mujeres |
| <b>Sí</b> | 53,2                                   | 1.431.738         | 50,1                                        | 2.454.849         | 48,7                                     | 3.138.530         | 23,7                                  | 3.393.933         |
| <b>No</b> | 46,4                                   |                   | 49,6                                        |                   | 51,0                                     |                   | 76,1                                  |                   |
| <b>NC</b> | 0,4                                    |                   | 0,4                                         |                   | 0,3                                      |                   | 0,2                                   |                   |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (incluyendo la violencia económica y la de control) de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre mujeres que no han sufrido violencia de la pareja.

$p < 0,001$ . El contraste X<sup>2</sup> se ha hecho entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y las que no han sufrido ningún tipo de violencia de la pareja.

El símbolo "0" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

Con respecto al segundo ítem de la pregunta (Tabla 14.36), el relativo a haber evitado estar a solas con alguien conocido porque a la mujer le produce temor o inseguridad, las mujeres que han sufrido violencia en la pareja responden de forma afirmativa en bastante mayor medida que las que nunca han sufrido violencia de la pareja: el 19,4% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja y el 13,7% de las mujeres que han sufrido cualquier forma de violencia de la pareja a lo largo de sus vidas han evitado, en los 12 meses previos a las entrevistas, estar a solas con alguien conocido porque les produce temor o inseguridad frente al 4,0% de las que nunca han sufrido violencia en la pareja. Esto implica que la probabilidad de haber evitado estar a solas con alguien conocido en los 12 meses previos a las entrevistas debido a temor o inseguridad es casi 5 veces mayor entre las que han sufrido violencia física o sexual de la pareja y 3,4 veces mayor entre las que han padecido cualquier forma de violencia de la pareja que entre las que nunca han sufrido violencia de la pareja.

Tabla 14.36 Se ha evitado estar a solas con alguien conocido en los 12 meses previos a las entrevistas debido a temor o inseguridad

|           | Violencia física o sexual de la pareja |                   | Violencia física, sexual, emocional o miedo |                   | Cualquier tipo de violencia de la pareja |                   | Ningún tipo de violencia de la pareja |                   |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
|           | % <sup>1</sup>                         | Número de mujeres | % <sup>2</sup>                              | Número de mujeres | % <sup>3</sup>                           | Número de mujeres | % <sup>4</sup>                        | Número de mujeres |
| <b>Sí</b> | 19,4                                   | 521.987           | 15,6                                        | 765.254           | 13,7                                     | 880.805           | 4,0                                   | 578.661           |
| <b>No</b> | 79,9                                   |                   | 83,5                                        |                   | 85,6                                     |                   | 95,7                                  |                   |
| <b>NC</b> | 0,7                                    |                   | 0,9                                         |                   | 0,8                                      |                   | 0,3                                   |                   |

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o miedo de alguna pareja; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (incluyendo la violencia económica y la de control) de alguna pareja; 4. Porcentaje sobre mujeres que no han sufrido violencia de la pareja.

$p < 0,001$ . El contraste X<sup>2</sup> se ha hecho entre las que han sufrido cualquier tipo de violencia de la pareja y las que no han sufrido ningún tipo de violencia de la pareja.

El símbolo "0" debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.