MINISTERIO
DE IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE IGUALDAD
Y PARA LA ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

MUJERES CON CONSUMOS ABUSIVOS O ADICCIONES EN LA MACROENCUESTA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2024

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



© Ministerio de Igualdad
Centro de Publicaciones
C/ Alcalá, 37 - 28071 Madrid

Esta publicación ha sido realizada por funcionarias de la Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia contra las Mujeres (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género).

NIPO en línea: 048-25-027-X

Correo electrónico: dgviolenciagenero@igualdad.gob.es

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado: https://cpage.mpr.gob.es

Índice

1 Introducción 4

2 Características sociodemográficas de las mujeres con consumos abusivos o adicciones en la macroencuesta 2024 6

2.1 Edad 6

2.2 Nivel de formación 7

2.3 País de nacimiento 8

2.4 Grado de urbanización 9

2.5 Situación laboral actual 9

2.6 Ingresos netos del hogar 10

2.7 Ingresos netos de la entrevistada 11

2.8 Vía de cumplimentación de la entrevista (CAWI, CASI, CAPI) 11

3 Violencia en la pareja 12

3.1 Prevalencia de la violencia en la pareja a lo largo de la vida 12

3.2 Prevalencia de la violencia en la pareja en los últimos 4 años 17

3.3 Prevalencia de la violencia en la pareja en los últimos 12 meses 22

3.4 Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia de la violencia en la pareja 27

3.5 Ruptura de la relación debido a la violencia de la pareja 29

3.6 Consecuencias físicas, psíquicas y laborales de la violencia en la pareja 29

3.6.1 Lesiones físicas 29

3.6.2 Consecuencias psicológicas 29

3.6.3 Secuelas físicas y/o psicológicas en la actualidad como consecuencia de la VFSEM de alguna pareja 30

3.6.4 Consumo de sustancias 31

3.6.5 Absentismo laboral como consecuencia de la violencia en la pareja 32

4 Violencia física fuera de la pareja 33

4.1 Prevalencia de la violencia física fuera de la pareja 33

4.2 Frecuencia de la violencia y número de agresores 34

4.3 Denuncia y búsqueda de ayuda 34

4.4 Consecuencias de la violencia física fuera del ámbito de la pareja 35

5 Violencia sexual fuera de la pareja 37

5.1 Prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja 37

5.2 Frecuencia de la violencia y número de agresores 41

5.3 Vínculo existente con la persona agresora 41

5.4 Denuncia y búsqueda de ayuda 42
5.5 Consecuencias de la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja 42
5.5.1 Lesiones físicas y consecuencias psicológicas 42
5.5.2 Secuelas físicas y/o psicológicas en la actualidad como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja 42
5.5.3 Consumo de sustancias 42
5.5.4 Absentismo laboral como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja 43
6 Acoso sexual 44
6.1 Prevalencia del acoso sexual 44
6.2 Frecuencia del acoso y número de agresores 44
6.3 Vínculo existente con la persona agresora 46
6.4 Denuncia y búsqueda de ayuda 46
6.5 Consecuencias del acoso sexual 47
7 Otras formas de acoso sin connotaciones sexuales 49
7.1 Prevalencia del acoso no sexual 49
7.2 Frecuencia 50
7.3 Vínculo existente con la persona agresora 50
7.4 Denuncia y búsqueda de ayuda 50
7.5 Consecuencias del acoso no sexual 50
8 Acoso reiterado y acoso digital 51

1 Introducción

En este documento se estudia la violencia sufrida por las mujeres según su consumo de las siguientes sustancias: 1) alcohol, 2) Cannabis, marihuana o hachís (cannabis, en adelante), 3) Cocaína, heroína, anfetaminas o speed, éxtasis, alucinógenos, metanfetamina, GHB, setas mágicas o psicodélicas, o inhalables volátiles como pegamento o poppers (otras drogas, en adelante).

El cuestionario contenía las siguientes preguntas destinadas a conocer posibles consumos abusivos o adicciones de las entrevistadas:

> *M0P15 Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha tomado al menos una bebida alcohólica de cualquier tipo (es decir, cerveza, vino, licores, bebidas destiladas y combinados u otras bebidas alcohólicas)?*
>
> La pregunta M0p15a se hacía a todas las entrevistadas menos a las que en M0P15 respondían no haber consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses:
>
> > *M0P15a Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha tomado 4 o más bebidas alcohólicas en una misma ocasión? Por "ocasión" entendemos tomar las bebidas en un intervalo aproximado de cuatro a seis horas. No excluya las bebidas alcohólicas tomadas durante las comidas.*
>
> *M0P16 Durante los últimos 12 meses, ¿ha consumido en alguna ocasión cannabis, marihuana o hachís?*
>
> A quienes respondían de forma afirmativa se les hacía la pregunta M0P16a:
>
> > *M0P16a ¿Con qué frecuencia?*
>
> *M0P16_bis Durante los últimos 12 meses, ¿ha consumido en alguna ocasión cocaína, heroína, anfetaminas o speed, éxtasis, alucinógenos, metanfetamina, GHB, setas mágicas o psicodélicas, o inhalables volátiles como pegamento o poppers?*
>
> A quienes respondían de forma afirmativa se les hacía la pregunta M0P16_bis_a:
>
> > *M0P16_bis_a ¿Con qué frecuencia?*

Debe tenerse en cuenta que las variables analizadas no constituyen indicadores diagnósticos de adicción o dependencia. No obstante, se han seleccionado como indicadores de posibles situaciones de consumo problemático o de mayor exposición a los riesgos asociados al consumo de sustancias.

En el caso del alcohol, se utiliza como indicador el consumo excesivo de alcohol, definido como la ingesta de cuatro o más bebidas alcohólicas en una misma ocasión (entendida como un intervalo aproximado de cuatro a seis horas) durante los últimos 12 meses, distinguiendo además la frecuencia con la que se han producido estos episodios. Para el cannabis y las otras drogas se analiza el consumo realizado durante los últimos 12 meses, diferenciando además la frecuencia de dicho consumo. Estas variables permiten identificar grupos de mujeres con

patrones de consumo potencialmente asociados a una mayor vulnerabilidad y, por tanto, resultan útiles para examinar su relación con las distintas formas de violencia analizadas en el estudio. Asimismo, permiten explorar la posible coexistencia entre el consumo de sustancias y distintas experiencias de victimización, sin que las asociaciones observadas deban interpretarse necesariamente como relaciones causales.

El 23,2 % de las mujeres ha consumido alcohol en exceso al menos en una ocasión en los últimos 12 meses (Tabla 6.1). En concreto, el 0,6 % lo han consumido en exceso todos o casi todos los días, el 0,8 % tres o 4 días por semana, el 5,4 % solo los fines de semana o 1-2 días por semana, el 3,1 % 2 o 3 días al mes, el 3,7 % una vez al mes y el 9,6 % menos de una vez al mes.

Tabla 6.1 Distribución de las mujeres según su frecuencia de consumo excesivo de alcohol en los últimos 12 meses

	%	Número de mujeres
No ha consumido alcohol	43,3	9.222.166
Ha consumido alcohol pero ninguna vez en exceso	32,3	6.883.233
Sí ha consumido alcohol en exceso	23,2	4.928.714
Todos o casi todos los días	0,6	117.532
3-4 días por semana	0,8	174.967
Solo los fines de semana/ 1 o 2 días por semana	5,4	1.154.328
2 o 3 días al mes	3,1	662.477
Una vez al mes	3,7	780.138
Menos de una vez al mes	9,6	2.039.272
NC	1,2	249.167
Total	100,0	21.283.281

El 2,5 % de las mujeres afirman haber consumido cannabis, marihuana o hachís en los últimos 12 meses: un 1,1 % menos de una vez al mes y, el resto, con mayor frecuencia (Tabla 6.2).

Tabla 6.2 Distribución de las mujeres según su frecuencia de consumo de cannabis, marihuana o hachís en los últimos 12 meses

	%	Número de mujeres
No	96,9	20.630.293
Sí	2,5	525.776
Todos o casi todos los días	0,4	92.309
3-4 días por semana	0,2	46.368
Solo los fines de semana/ 1 o 2 días por semana	0,3	68.831
2 o 3 días al mes	0,2	45.887
Una vez al mes	0,2	33.277 [b]
Menos de una vez al mes	1,1	239.104
NC	0,6	127.212
Total	100,0	21.283.281

El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

El 0,8 % de las mujeres afirman haber consumido otras drogas como cocaína, heroína o anfetaminas en los últimos 12 meses: un 0,6 % menos de una vez al mes y, el resto, con mayor frecuencia (Tabla 6.3).

Tabla 6.3 Distribución de las mujeres según su frecuencia de consumo de otras drogas en los últimos 12 meses

	%	Número de mujeres	
No	98,7	21.010.231	
Sí	0,8	174.696	
Todos o casi todos los días	.	.	
3-4 días por semana	.	.	
Solo los fines de semana/ 1 o 2 días por semana	.	.	
2 o 3 días al mes	.	.	
Una vez al mes	0,1	13.979	b
Menos de una vez al mes	0,6	134.055	
NC	0,5	98.354	
Total	100,0	21.283.281	

El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

2 Características sociodemográficas de las mujeres con consumos abusivos o adicciones en la macroencuesta 2024

En este epígrafe se presentan las principales características sociodemográficas de las mujeres con consumos abusivos o adicciones con el objetivo de contextualizar el posterior análisis sobre la violencia sufrida por estas mujeres.

2.1 Edad

El 17,9 % de las mujeres que no han consumido alcohol en exceso en los últimos 12 meses tiene entre 16 y 34 años y el 32,3 %, 65 años o más[1]. En cambio, entre quienes lo han consumido en exceso menos de una vez al mes o al menos una vez al mes, el 40,0 % y 36,0 % respectivamente tienen entre 16 y 34 años y el 7,7 % y 9,4 % respectivamente, 65 años o más (Tabla 6.4).

Algo similar ocurre con el consumo de drogas: el 21,5 % de las mujeres que no han consumido cannabis en los últimos 12 meses tiene entre 16 y 34 años y el 27,4 %, 65 años o más. En cambio, entre quienes lo han consumido menos de una vez al mes o al menos una vez al mes, el 75,6 % y 56,5 % respectivamente tienen entre 16 y 34 años, siendo el consumo prácticamente inexistente entre las mujeres de 65 años o más (Tabla 6.4).

A su vez, el 22,3 % de las mujeres que no han consumido otras drogas como cocaína o heroína en los últimos 12 meses tiene entre 16 y 34 años y el 26,9 %, 65 años o más. En cambio, entre

[1] Para facilitar la exposición de los resultados, en el texto se presentan de forma agregada los grupos de edad de 16 a 34 años y de 65 o más años, obtenidos mediante la suma de las categorías correspondientes mostradas en la tabla.

quienes sí las han consumido el 58,1 % tienen entre 16 y 34 años, siendo el consumo prácticamente inexistente entre las mujeres de 65 años o más (Tabla 6.4).

Las diferencias en la estructura de edad entre consumidoras y no consumidoras también se reflejan en la edad media de ambos grupos. Así, la edad media de las mujeres que no han realizado consumos excesivos de alcohol en los últimos 12 meses es de 53,5 años, frente a 41,4 años entre quienes sí los han realizado. Las diferencias son aún más acusadas en el caso del cannabis y de las otras drogas: la edad media de las mujeres que han consumido cannabis en los últimos 12 meses es de 32,5 años, frente a 51,1 años entre las no consumidoras, mientras que entre las consumidoras de otras drogas la edad media es de 33,3 años, frente a 50,7 años entre las no consumidoras.

La edad parece ser una de las variables más estrechamente asociadas al consumo de sustancias. Las mujeres consumidoras de alcohol en exceso, cannabis y otras drogas presentan una estructura de edad considerablemente más joven que las no consumidoras. Este hecho debe tenerse en cuenta en la interpretación de los resultados que se presentan a continuación, ya que parte de las diferencias observadas según el consumo de sustancias podría estar relacionada con las diferencias de edad existentes entre los grupos comparados.

Tabla 6.4 Distribución porcentual de las mujeres por grupos de edad, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (% fila)

		16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+
Alcohol (consumo excesivo)	No	7,9	9,9	14,6	17,7	17,5	14,7	17,5
	Menos de 1 vez al mes	17,5	22,5	20,8	19,4	12,1	5,4	2,3
	Al menos 1 vez al mes	17,1	18,9	18,1	21,7	14,9	6,5	2,9
	p<0,001							
Cannabis, marihuana o hachís	No	9,7	11,7	15,7	18,7	16,8	13,0	14,3
	Menos de 1 vez al mes	35,6	40,0	14,0	5,1 [b]	.	.	.
	Al menos 1 vez al mes	25,6	30,9	17,9	16,8	8,2 [b]	.	.
	p<0,001							
Otras drogas	No	10,1	12,2	15,6	18,5	16,7	12,8	14,1
	Sí	27,0	31,1	21,9	18,5 [b]	.	.	.
	p<0,001							

El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).
En esta tabla y en el resto de tablas del capítulo con contrastes de significación se han eliminado los N.C. para calcular los contrastes.

2.2 Nivel de formación

El 16,7 % de las mujeres que no han consumido alcohol en exceso en los últimos 12 meses tiene estudios primarios o inferiores y el 23,8 %, estudios universitarios. En cambio, entre quienes lo han consumido en exceso menos de una vez al mes o al menos una vez al mes, el 3,8 % y 4,5 % respectivamente tienen estudios primarios o inferiores y el 40,7 % y 42,0 % respectivamente, estudios universitarios (Tabla 6.5).

El 14,0 % de las mujeres que no han consumido cannabis en los últimos 12 meses tiene estudios primarios o inferiores y el 27,5 %, estudios universitarios. En cambio, el 48,7 % de quienes lo han consumido menos de una vez al mes tiene estudios universitarios. Entre quienes lo han consumido al menos una vez al mes el 5,5 % tiene estudios primarios o inferiores y el 36,3 % estudios universitarios (Tabla 6.5).

El 13,8 % de las mujeres que no han consumido otras drogas como cocaína o heroína en los últimos 12 meses tiene estudios primarios o inferiores y el 27,6 %, estudios universitarios. En cambio, entre quienes sí las han consumido el 60,5 % tienen estudios universitarios.

Tabla 6.5 Distribución porcentual de las mujeres por nivel de formación, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (% fila)

		Estudios primarios o inferiores	Estudios secundarios (1ª etapa)	Estudios secundarios (2ª etapa)	FP de grado superior	Estudios universitarios
Alcohol (consumo excesivo)	No	16,7	30,7	19,0	9,8	23,8
	Menos de 1 vez al mes	3,8	17,3	25,2	13,0	40,7
	Al menos 1 vez al mes	4,5	16,1	23,6	13,8	42,0
	p<0,001					
Cannabis, marihuana o hachís	No	14,0	27,9	20,0	10,6	27,5
	Menos de 1 vez al mes	.	11,2 [b]	29,6	10,5 [b]	48,7
	Al menos 1 vez al mes	5,5 [b]	14,8	27,7	15,7	36,3
	p<0,001					
Otras drogas	No	13,8	27,6	20,3	10,7	27,6
	Sí	.	9,6 [b]	14,6 [b]	12,9 [b]	60,5
	p<0,001					

El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

2.3 País de nacimiento

Las diferencias en la distribución de las mujeres por país de nacimiento son escasas y solo alcanzan la significatividad estadística para el consumo excesivo de alcohol: el 20,7 % de las mujeres que no han consumido alcohol en exceso en los últimos 12 meses ha nacido en el extranjero, frente al 17,3 % y 17,6 %, respectivamente, de la que lo han consumido en exceso al menos una vez al mes, o menos de una vez al mes (Tabla 6.6).

Tabla 6.6 Distribución porcentual de las mujeres por país de nacimiento, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (% fila)

		España	Otro país
Alcohol (consumo excesivo)	No	79,3	20,7
	Menos de 1 vez al mes	82,7	17,3
	Al menos 1 vez al mes	82,4	17,6
	p<0,001		
Cannabis, marihuana o hachís	No	80,0	20,0
	Menos de 1 vez al mes	79,8	20,2
	Al menos 1 vez al mes	79,8	20,2
	ns		
Otras drogas	No	79,9	20,1
	Sí	87,2	12,8 [b]
	ns		

El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

2.4 Grado de urbanización

Las diferencias en la distribución de las mujeres por grado de urbanización del municipio de residencia solo son estadísticamente significativas para el consumo excesivo de alcohol, siendo además de poca magnitud (Tabla 6.7).

Tabla 6.7 Distribución porcentual de las mujeres por grado de urbanización del municipio de residencia, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (% fila)

		Área densamente poblada	Área poblada nivel intermedio	Área poco poblada
Alcohol (consumo excesivo)	No	53,7	33,0	13,3
	Menos de 1 vez al mes	58,6	29,4	12,0
	Al menos 1 vez al mes	58,8	29,3	11,9
	p<0,01			
Cannabis, marihuana o hachís	No	54,8	32,2	13,0
	Menos de 1 vez al mes	61,0	30,5	8,5 [b]
	Al menos 1 vez al mes	61,9	25,8	12,3
	ns			
Otras drogas	No	54,9	32,1	13,0
	Sí	62,6	30,0	7,5 [b]
	ns			

El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

2.5 Situación laboral actual

El 39,6 % de las mujeres que no han consumido alcohol en exceso en los últimos 12 meses trabaja por cuenta ajena, el 6,2 % es estudiante, el 21,5 % está jubilada, el 7,9 % es pensionista y el 11,8 % realiza trabajo doméstico no remunerado. En cambio, entre quienes lo han consumido en exceso menos de una vez al mes o al menos una vez al mes hay una mayor

presencia relativa de quienes trabajan por cuenta ajena (60,6 % y 55,5 %, respectivamente) y las estudiantes (12,6 % y 14,3 %, respectivamente), y una menor presencia relativa de las jubiladas (5,4 % y 7,8 %, respectivamente), pensionistas (2,4 % y 2,3 %, respectivamente) y las que realizan trabajo doméstico no remunerado (4,4 % y 3,5 %, respectivamente). Un patrón similar se observa en el consumo de cannabis y otras drogas (Tabla 6.8).

Tabla 6.8 Distribución porcentual de las mujeres por situación laboral actual, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (% fila)

		Trabaja por cuenta ajena	Trabaja por cuenta propia o en negocio familiar	Parada	Jubilada	Pensionista	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado
Alcohol (consumo excesivo)	No	39,6	4,6	8,5	21,5	7,9	6,2	11,8
	Menos de 1 vez al mes	60,6	7,4	7,2	5,4	2,4	12,6	4,4
	Al menos 1 vez al mes	55,5	8,3	8,3	7,8	2,3	14,3	3,5
	p<0,001							
Cannabis, marihuana o hachís	No	43,5	5,3	8,3	18,5	6,7	7,6	10,0
	Menos de 1 vez al mes	56,6	7,1 [b]	6,2 [b]	.	.	27,7	.
	Al menos 1 vez al mes	53,9	9,6 [b]	12,3 [b]	.	.	18,3	4,8 [b]
	p<0,001							
Otras drogas	No	43,7	5,3	8,3	18,2	6,6	8,0	9,9
	Sí	56,8	13,4 [b]	14,8 [b]	.	.	11,3 [b]	.
	p<0,001							

El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

2.6 Ingresos netos del hogar

El 18,7 % de las mujeres que no han consumido alcohol en exceso vive en hogares con ingresos netos superiores a 3.000 euros mensuales, frente al 32,7 % y 32,0 %, respectivamente de quienes lo han consumido en exceso menos de una vez al mes o al menos una vez al mes (Tabla 6.9).

Tabla 6.9 Distribución porcentual de las mujeres por nivel de ingresos del hogar, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (% fila)

		Menor o igual a 900 €	901-3.000 €	Más de 3.000 €
Alcohol (consumo excesivo)	No	13,3	68,0	18,7
	Menos de 1 vez al mes	6,0	61,3	32,7
	Al menos 1 vez al mes	6,5	61,5	32,0
	p<0,001			
Cannabis, marihuana o hachís	No	11,5	66,2	22,3
	Menos de 1 vez al mes	6,0 [b]	68,3	25,6
	Al menos 1 vez al mes	9,9 [b]	64,8	25,4
	ns			
Otras drogas	No	11,5	66,3	22,2
	Sí	9,3 [b]	58,3	32,5
	ns			

El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

2.7 Ingresos netos de la entrevistada

El 43,5 % de las mujeres que no han consumido alcohol en exceso tiene ingresos netos propios menores o iguales a 900 euros mensuales, frente al 30,5 % y 31,2 %, respectivamente de quienes lo han consumido en exceso menos de una vez al mes, o al menos una vez al mes (Tabla 6.10).

Tabla 6.10 Distribución porcentual de las mujeres por su nivel de ingresos, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (% fila)

		Menor o igual a 900 €	901-3.000 €	Más de 3.000 €
Alcohol (consumo excesivo)	No	43,5	52,9	3,6
	Menos de 1 vez al mes	30,5	62,7	6,8
	Al menos 1 vez al mes	31,2	62,5	6,4
	p<0,001			
Cannabis, marihuana o hachís	No	40,4	55,3	4,4 [b]
	Menos de 1 vez al mes	39,4	55,1	5,6
	Al menos 1 vez al mes	36,5	59,3	4,3 [b]
	ns			
Otras drogas	No	40,4	55,2	4,3
	Sí	28,2	67,8	4,0
	ns			

El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

2.8 Vía de cumplimentación de la entrevista (CAWI, CASI, CAPI)

El 63,9 % de las mujeres que no han consumido alcohol en exceso ha respondido a la encuesta por CAPI frente al 18,5 % de quienes lo han consumido en exceso al menos una vez al mes. El

mismo patrón se observa para el consumo de drogas, siendo significativamente menor el porcentaje de quienes responden por CAPI (y mayor el de quienes han cumplimentado la entrevista por CAWI) entre quienes las han consumido en los últimos 12 meses (Tabla 6.11).

Tabla 6.11 Distribución porcentual de las mujeres por la vía de cumplimentación de la entrevista, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (% fila)

		CAWI	CASI	CAPI
Alcohol (consumo excesivo)	No	27,3	8,9	63,9
	Menos de 1 vez al mes	54,7	14,5	30,8
	Al menos 1 vez al mes	67,2	14,4	18,5
	p<0,001			
Cannabis, marihuana o hachís	No	35,0	10,0	55,0
	Menos de 1 vez al mes	63,7	16,3	20,0
	Al menos 1 vez al mes	53,9	21,2	24,8
	p<0,001			
Otras drogas	No	35,3	10,2	54,5
	Sí	76,4	13,2 [b]	10,4 [b]
	p<0,001			

El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

3 Violencia en la pareja

3.1 Prevalencia de la violencia en la pareja a lo largo de la vida

La prevalencia de violencia ejercida por la pareja a lo largo de la vida es, en general, superior entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso en los últimos 12 meses que entre aquellas que no lo han hecho. Esta pauta se observa para prácticamente todos los tipos de violencia analizados y en los distintos tipos de pareja considerados, siendo las diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de los casos (Tabla 6.12).

Por ejemplo, la prevalencia de violencia total entre las mujeres que han tenido pareja alguna vez en la vida es del 27,1 % entre quienes no han consumido alcohol en exceso, frente al 49,7 % entre quienes lo han consumido menos de una vez al mes y al 54,2 % entre quienes lo han hecho al menos una vez al mes. Del mismo modo, la prevalencia de violencia física y/o sexual alcanza el 11,3 % entre las mujeres que no han consumido alcohol en exceso, frente al 21,6 % y al 22,2 %, respectivamente, entre quienes declaran un consumo menos frecuente y más frecuente.

Tabla 6.12 Prevalencia de violencia ejercida por la pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida, por tipo de violencia, según consumo excesivo de alcohol en los últimos 12 meses (%)

		Pareja actual[1]	Parejas pasadas[2]	Cualquier pareja[3]	Total de mujeres[4]
1. Física	No	1,3	13,4	8,7	8,0
	Menos de 1 vez al mes	1,5 [b]	15,6	13,1	12,0
	Al menos 1 vez al mes	2,3	18,4	15,3	14,0
		ns	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
2. Sexual	No	1,6	9,2	6,4	5,9
	Menos de 1 vez al mes	3,9	18,1	16,0	14,6
	Al menos 1 vez al mes	3,7	16,1	14,2	13,0
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
3. Física y/o sexual (1+2)	No	2,4	16,7	11,3	10,4
	Menos de 1 vez al mes	4,8	24,6	21,6	19,8
	Al menos 1 vez al mes	5,0	25,9	22,2	20,3
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
4.Emocional	No	6,5	26,0	18,7	17,2
	Menos de 1 vez al mes	14,5	36,9	35,3	32,4
	Al menos 1 vez al mes	13,3	40,5	36,9	33,7
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
5.Control	No	10,2	29,0	22,2	20,4
	Menos de 1 vez al mes	18,3	43,0	40,6	37,3
	Al menos 1 vez al mes	23,6	47,8	46,7	42,6
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
6.Económica	No	4,3	15,5	11,6	10,7
	Menos de 1 vez al mes	6,2	15,2	16,0	14,7
	Al menos 1 vez al mes	7,5	16,1	16,9	15,4
		p<0,001	*ns*	*p<0,001*	*p<0,001*
7.Miedo	No	2,5	16,3	11,1	10,3
	Menos de 1 vez al mes	3,4	20,9	18,3	16,8
	Al menos 1 vez al mes	3,3	20,1	17,1	15,6
		ns	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
8.Psicológica y/o económica (4+5+6+7)	No	13,4	34,6	26,7	24,6
	Menos de 1 vez al mes	24,2	49,7	48,4	44,4
	Al menos 1 vez al mes	29,6	53,9	53,0	48,4
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
9.Violencia total (3+8)	No	13,6	35,2	27,1	25,0
	Menos de 1 vez al mes	25,1	51,2	49,7	45,6
	Al menos 1 vez al mes	30,5	55,3	54,2	49,5
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*

1. Porcentaje sobre el total de mujeres con pareja actual en cada categoría; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres con parejas pasadas en cada categoría; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han tenido pareja alguna vez en su vida en cada categoría; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
ns= no significativo.

En cuanto a la variable relativa al consumo de cannabis, hachís o marihuana (Tabla 6.13), la prevalencia de violencia ejercida por la pareja a lo largo de la vida es, en general, superior entre

las mujeres que han consumido cannabis en los últimos 12 meses que entre aquellas que no lo han hecho. Esta pauta se observa para prácticamente todos los tipos de violencia analizados y en los distintos tipos de pareja considerados, siendo las prevalencias generalmente más elevadas entre quienes declaran un consumo más frecuente. Por ejemplo, la prevalencia de violencia total entre las mujeres que han tenido pareja alguna vez en la vida es del 31,8 % entre quienes no han consumido cannabis, frente al 65,6 % entre quienes lo han consumido menos de una vez al mes y al 81,8 % entre quienes lo han hecho al menos una vez al mes. Del mismo modo, la prevalencia de violencia física y/o sexual alcanza el 13,0 % entre las mujeres que no han consumido cannabis, frente al 39,8 % y al 48,3 %, respectivamente, entre quienes declaran un consumo menos frecuente y más frecuente.

Las diferencias observadas según consumo de cannabis son, en general, más acusadas que las observadas según consumo excesivo de alcohol.

Tabla 6.13 Prevalencia de violencia ejercida por la pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida, por tipo de violencia, según consumo de cannabis en los últimos 12 meses (%)

		Pareja actual[1]	Parejas pasadas[2]	Cualquier pareja[3]	Total de mujeres[4]
1. Física	No	1,3	14,1	9,6	8,8
	Menos de 1 vez al mes	.	17,7 [b]	19,3	17,4
	Al menos 1 vez al mes	.	32,1	32,2	29,2
		*p<0,001^*	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
2. Sexual	No	2,0	10,5	7,7	7,1
	Menos de 1 vez al mes	10,6 [b]	31,7	32,7	29,5
	Al menos 1 vez al mes	.	38,7	35,6	32,3
		*p<0,001^*	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
3. Física y/o sexual (1+2)	No	2,8	18,2	13,0	11,9
	Menos de 1 vez al mes	13,2 [b]	37,8	39,8	35,8
	Al menos 1 vez al mes	11,5 [b]	50,8	48,3	43,8
		*p<0,001^*	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
4.Emocional	No	8,0	28,5	21,9	20,1
	Menos de 1 vez al mes	14,5 [b]	54,1	50,1	45,1
	Al menos 1 vez al mes	23,5 [b]	63,1	64,1	58,2
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
5.Control	No	12,5	32,5	26,2	24,1
	Menos de 1 vez al mes	19,0 [b]	57,9	54,6	49,2
	Al menos 1 vez al mes	34,6	70,7	73,0	66,2
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
6.Económica	No	4,9	15,5	12,6	11,6
	Menos de 1 vez al mes	.	15,6 [b]	16,7 [b]	15,0
	Al menos 1 vez al mes	.	20,2	20,3	18,4
			ns	*p<0,05*	*p<0,05*
7.Miedo	No	2,6	16,9	12,1	11,1
	Menos de 1 vez al mes	.	27,4	26,9	24,3
	Al menos 1 vez al mes	.	35,7	35,7	32,4
			p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*
8.Psicológica y/o económica (4+5+6+7)	No	16,4	38,3	31,3	28,7
	Menos de 1 vez al mes	22,5 [b]	65,8	61,7	55,6
	Al menos 1 vez al mes	38,7	77,0	78,7	71,4
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
9.Violencia total (3+8)	No	16,7	39,0	31,8	29,2
	Menos de 1 vez al mes	27,2	67,0	65,6	59,1
	Al menos 1 vez al mes	40,5	81,3	81,8	74,2
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*

1. Porcentaje sobre el total de mujeres con pareja actual en cada categoría; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres con parejas pasadas en cada categoría; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han tenido pareja alguna vez en su vida en cada categoría; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada categoría.

El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

ns= no significativo.

^ En más del 20 % de las casillas los recuentos esperados son inferiores a 5, por lo que el contraste χ^2 puede no ser válido.

La prevalencia de violencia ejercida por la pareja a lo largo de la vida es, en general, superior entre las mujeres que han consumido otras drogas en los últimos 12 meses que entre aquellas que no lo han hecho (Tabla 6.14). Esta pauta se observa para prácticamente todos los tipos de violencia analizados y en los distintos tipos de pareja considerados. Por ejemplo, entre las mujeres que han tenido pareja alguna vez en la vida, la prevalencia de violencia total pasa del 32,5 % entre quienes no han consumido otras drogas al 79,1 % entre quienes sí las han consumido. Asimismo, la prevalencia de violencia física y/o sexual aumenta del 13,4 % al 47,7 %. No obstante, en algunos análisis referidos a la pareja actual el reducido número de casos aconseja interpretar los resultados con cautela.

Tabla 6.14 Prevalencia de violencia ejercida por la pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida, por tipo de violencia, según consumo de otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Pareja actual[1]	Parejas pasadas[2]	Cualquier pareja[3]	Total de mujeres[4]
1. Física	No	1,5	14,2	9,8	9,0
	Sí	.	32,7	32,6	30,2
			p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*
2. Sexual	No	2,1	11,1	8,2	7,5
	Sí	.	35,8	35,6	33,0
			p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*
3. Física y/o sexual (1+2)	No	3,0	18,8	13,4	12,3
	Sí	.	48,2	47,7	44,1
			p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*
4.Emocional	No	8,2	29,2	22,4	20,5
	Sí	20,1 [b]	63,9	66,6	61,7
		*p<0,01^*	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
5.Control	No	12,8	33,2	26,8	24,6
	Sí	29,6 [b]	68,5	73,4	68,0
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
6.Económica	No	4,9	15,5	12,7	11,7
	Sí	.	15,9 [b]	15,4 [b]	14,3 [b]
			ns	*ns*	*ns*
7.Miedo	No	2,7	17,1	12,4	11,4
	Sí	.	34,6	34,5	32,0
			p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*
8.Psicológica y/o económica (4+5+6+7)	No	16,6	39,0	31,9	29,3
	Sí	36,4 [b]	75,4	77,7	72,0
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
9.Violencia total (3+8)	No	17,0	39,8	32,5	29,9
	Sí	36,4 [b]	76,7	79,1	73,2
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*

1. Porcentaje sobre el total de mujeres con pareja actual en cada categoría; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres con parejas pasadas en cada categoría; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han tenido pareja alguna vez en su vida en cada categoría; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).
ns= no significativo.
^ En más del 20 % de las casillas los recuentos esperados son inferiores a 5, por lo que el contraste χ^2 puede no ser válido.

3.2 Prevalencia de la violencia en la pareja en los últimos 4 años

La prevalencia de violencia ejercida por la pareja en los cuatro años previos a la entrevista es, en general, superior entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso en los últimos 12 meses que entre aquellas que no lo han hecho. Esta pauta se observa para prácticamente todos los tipos de violencia analizados y en los distintos tipos de pareja considerados. Por ejemplo, entre las mujeres que han tenido pareja alguna vez en la vida, la prevalencia de violencia total pasa del 11,8 % entre quienes no han consumido alcohol en exceso al 26,4 % entre quienes lo

han hecho menos de una vez al mes y al 31,3 % entre quienes lo han hecho al menos una vez al mes. Asimismo, la prevalencia de violencia física y/o sexual aumenta del 3,8 % al 9,6 % y al 10,9 %, respectivamente (Tabla 6.15)

*Tabla 6.15 Prevalencia de violencia ejercida por la pareja (actual o pasada) en los 4 años previos a la entrevista, por tipo de violencia, según consumo excesivo de alcohol en los últimos 12 meses (%)**

		Pareja actual[1]	Parejas pasadas[2]	Cualquier pareja[3]	Total de mujeres[4]
1. Física	No	0,7	3,3	2,4	2,2
	Menos de 1 vez al mes	1,0 [b]	5,3	4,8	4,4
	Al menos 1 vez al mes	1,9 [b]	7,2	6,7	6,2
		p<0,01	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
2. Sexual	No	1,0	2,8	2,3	2,1
	Menos de 1 vez al mes	2,4	7,2	7,2	6,6
	Al menos 1 vez al mes	2,8	7,2	7,2	6,6
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
3. Física y/o sexual (1+2)	No	1,4	4,8	3,8	3,5
	Menos de 1 vez al mes	3,2	9,6	9,6	8,8
	Al menos 1 vez al mes	3,8	11,2	10,9	10,0
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
4.Emocional	No	5,0	8,1	8,0	7,4
	Menos de 1 vez al mes	11,9	15,4	19,5	17,9
	Al menos 1 vez al mes	10,5	19,1	20,7	18,9
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
5.Control	No	5,6	6,4	7,4	6,9
	Menos de 1 vez al mes	10,1	13,2	17,0	15,6
	Al menos 1 vez al mes	13,5	17,4	21,6	19,7
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
6.Económica	No	2,5	3,6	3,7	3,5
	Menos de 1 vez al mes	4,2	4,1	6,2	5,7
	Al menos 1 vez al mes	4,1	5,8	6,9	6,3
		p<0,05	*ns*	*ns*	*ns*
8.Psicológica y/o económica (4+5+6+7)	No	8,4	10,2	11,3	10,4
	Menos de 1 vez al mes	16,9	18,4	24,6	22,6
	Al menos 1 vez al mes	19,2	24,3	29,7	27,1
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
9.Violencia total (3+8)	No	8,6	10,9	11,8	10,9
	Menos de 1 vez al mes	17,6	20,3	26,4	24,2
	Al menos 1 vez al mes	19,7	26,2	31,3	28,6
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*

** En la violencia ejercida en los últimos cuatro años, no se pregunta por el miedo.*
1. Porcentaje sobre el total de mujeres con pareja actual en cada categoría, 2. Porcentaje sobre el total de mujeres con parejas pasadas en cada categoría, 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han tenido pareja alguna vez en su vida en cada categoría, 4. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
ns= no significativo.

La prevalencia de violencia ejercida por la pareja en los cuatro años previos a la entrevista es, en general, superior entre las mujeres que han consumido cannabis en los últimos 12 meses que entre aquellas que no lo han hecho (Tabla 6.16). Esta pauta se observa para prácticamente todos los tipos de violencia analizados y en los distintos tipos de pareja considerados, siendo las prevalencias generalmente más elevadas entre quienes declaran un consumo más frecuente. Por ejemplo, entre las mujeres que han tenido pareja alguna vez en la vida, la prevalencia de violencia total pasa del 15,0 % entre quienes no han consumido cannabis al 44,0 % entre quienes lo han consumido menos de una vez al mes y al 52,7 % entre quienes lo han hecho al menos una vez al mes. Asimismo, la prevalencia de violencia física y/o sexual aumenta del 4,8 % al 19,8 % y al 25,5 %, respectivamente.

*Tabla 6.16 Prevalencia de violencia ejercida por la pareja (actual o pasada) en los 4 años previos a la entrevista, por tipo de violencia, según consumo de cannabis en los últimos 12 meses (%)**

		Pareja actual[1]	Parejas pasadas[2]	Cualquier pareja[3]	Total de mujeres[4]
1. Física	No	0,8	3,9	3,0	2,7
	Menos de 1 vez al mes	.	8,0 [b]	9,0 [b]	8,1 [b]
	Al menos 1 vez al mes	.	13,6	16,2	14,7
			p<0,001	*p<0,001^*	*p<0,001^*
2. Sexual	No	1,2	3,5	3,0	2,8
	Menos de 1 vez al mes	.	15,9 [b]	18,0 [b]	16,3
	Al menos 1 vez al mes	.	19,4	18,8	17,1
			p<0,001	*p<0,001^*	*p<0,001^*
3. Física y/o sexual (1+2)	No	1,8	5,8	4,8	4,4
	Menos de 1 vez al mes	.	17,9 [b]	19,8	17,8
	Al menos 1 vez al mes	.	24,8	25,5	23,1
			p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*
4.Emocional	No	6,3	9,9	10,2	9,4
	Menos de 1 vez al mes	14,5 [b]	28,7	31,5	28,3
	Al menos 1 vez al mes	18,6 [b]	37,2	40,0	36,3
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
5.Control	No	7,0	8,2	9,6	8,8
	Menos de 1 vez al mes	15,7 [b]	25,4	29,9	26,9
	Al menos 1 vez al mes	20,3 [b]	38,7	42,9	38,9
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
6.Económica	No	2,8	3,7	4,2	3,9
	Menos de 1 vez al mes	.	10,7 [b]	12,3 [b]	11,1 [b]
	Al menos 1 vez al mes	.	11,7 [b]	11,8 [b]	10,7 [b]
			p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*
8.Psicológica y/o económica (4+5+6+7)	No	10,5	12,5	14,3	13,1
	Menos de 1 vez al mes	20,2 [b]	37,5	41,8	37,6
	Al menos 1 vez al mes	26,7 [b]	46,3	50,0	45,4
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
9.Violencia total (3+8)	No	10,8	13,4	15,0	13,8
	Menos de 1 vez al mes	22,1 [b]	38,7	44,0	39,7
	Al menos 1 vez al mes	28,6	49,2	52,7	47,8
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*

** En la violencia ejercida en los últimos cuatro años, no se pregunta por el miedo.*
1. Porcentaje sobre el total de mujeres con pareja actual en cada categoría; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres con parejas pasadas en cada categoría; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han tenido pareja alguna vez en su vida en cada categoría; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).
ns= no significativo.
^ En más del 20 % de las casillas los recuentos esperados son inferiores a 5, por lo que el contraste χ^2 puede no ser válido.

La prevalencia de violencia ejercida por la pareja en los cuatro años previos a la entrevista es, en general, superior entre las mujeres que han consumido otras drogas en los últimos 12 meses que entre aquellas que no lo han hecho (Tabla 6.17). Esta pauta se observa para prácticamente todos

los tipos de violencia analizados y en los distintos tipos de pareja considerados. Por ejemplo, entre las mujeres que han tenido pareja alguna vez en la vida, la prevalencia de violencia total es más de tres veces superior entre las consumidoras de otras drogas que entre las no consumidoras (51,8 % frente a 15,5 %). Asimismo, la prevalencia de violencia física y/o sexual alcanza el 31,4 % entre las consumidoras frente al 5,1 % entre las no consumidoras, lo que supone un valor más de seis veces superior. No obstante, algunos resultados deben interpretarse con cautela debido al reducido número de casos en determinadas categorías de consumo.

*Tabla 6.17 Prevalencia de violencia ejercida por la pareja (actual o pasada) en los 4 años previos a la entrevista, por tipo de violencia, según consumo de otras drogas en los últimos 12 meses (%)**

		Pareja actual[1]	Parejas pasadas[2]	Cualquier pareja[3]	Total de mujeres[4]
1. Física	No	0,8	4,0	3,0	2,8
	Sí	.	20,0 [b]	21,3 [b]	19,8 [b]
			*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001^*
2. Sexual	No	1,4	3,8	3,3	3,0
	Sí	.	22,7 [b]	22,9 [b]	21,2 [b]
			*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001^*
3. Física y/o sexual (1+2)	No	1,9	6,1	5,1	4,6
	Sí	.	30,3	31,4	29,0
			p<0,001	*p<0,001^*	*p<0,001^*
4.Emocional	No	6,4	10,5	10,6	9,7
	Sí	14,3 [b]	36,0	39,2	36,3
		*p<0,05^*	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
5.Control	No	7,1	8,6	10,0	9,2
	Sí	19,1 [b]	34,1	42,1	39,0
		*p<0,001^*	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
6.Económica	No	2,9	3,8	4,3	3,9
	Sí	.	12,0 [b]	11,6 [b]	10,8 [b]
			*p<0,001^*	*p<0,01^*	*p<0,01^*
8.Psicológica y/o económica (4+5+6+7)	No	10,7	13,1	14,8	13,6
	Sí	27,5 [b]	42,1	50,4	46,7
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
9.Violencia total (3+8)	No	11,0	14,1	15,5	14,2
	Sí	27,5 [b]	43,5	51,8	48,0
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*

** En la violencia ejercida en los últimos cuatro años, no se pregunta por el miedo.*
1. Porcentaje sobre el total de mujeres con pareja actual en cada categoría; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres con parejas pasadas en cada categoría; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han tenido pareja alguna vez en su vida en cada categoría; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).
ns= no significativo.
^ En más del 20 % de las casillas los recuentos esperados son inferiores a 5, por lo que el contraste χ^2 puede no ser válido.

3.3 Prevalencia de la violencia en la pareja en los últimos 12 meses

La prevalencia de violencia ejercida por la pareja en los 12 meses previos a la entrevista es, en general, superior entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso en los últimos 12 meses que entre aquellas que no lo han hecho (Tabla 6.18). Este patrón se observa para prácticamente todos los tipos de violencia analizados y en los distintos tipos de pareja considerados. Por ejemplo, entre las mujeres que han tenido pareja alguna vez en la vida, la prevalencia de violencia total es del 9,6 % entre quienes no han consumido alcohol en exceso, frente al 19,8 % entre quienes lo han hecho menos de una vez al mes y al 24,2 % entre quienes lo han consumido en exceso al menos una vez al mes. Asimismo, la prevalencia de violencia física y/o sexual aumenta del 2,1 % al 5,3 % y al 6,8 %, respectivamente.

Tabla 6.18 Prevalencia de violencia ejercida por la pareja (actual o pasada) en los 12 meses previos a la entrevista, por tipo de violencia, según consumo excesivo de alcohol en los últimos 12 meses

		Pareja actual[1]	Parejas pasadas[2]	Cualquier pareja[3]	Total de mujeres[4]
1. Física	No	0,3	1,5	1,1	1,0
	Menos de 1 vez al mes	0,7 [b]	2,8	2,7	2,5
	Al menos 1 vez al mes	1,6 [b]	3,7	4,0	3,6
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
2. Sexual	No	0,7	1,4	1,3	1,2
	Menos de 1 vez al mes	1,9 [b]	2,8	3,5	3,2
	Al menos 1 vez al mes	2,6	3,3	4,4	4,0
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
3. Física y/o sexual (1+2)	No	1,0	2,4	2,1	1,9
	Menos de 1 vez al mes	2,5	4,5	5,3	4,9
	Al menos 1 vez al mes	3,3	5,7	6,8	6,2
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
4.Emocional	No	4,1	4,7	5,4	5,0
	Menos de 1 vez al mes	9,4	6,6	11,7	10,8
	Al menos 1 vez al mes	9,2	12,5	15,3	14,0
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
5.Control	No	4,0	1,7	3,7	3,4
	Menos de 1 vez al mes	7,9	3,4	8,4	7,7
	Al menos 1 vez al mes	10,0	5,8	11,3	10,4
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
6.Económica	No	2,1	0,9	1,9	1,8
	Menos de 1 vez al mes	3,2	1,0 [b]	3,1	2,8
	Al menos 1 vez al mes	3,3	1,6 [b]	3,3	3,1
		p<0,05	*ns*	*p<0,001*	*p<0,001*
7.Miedo	No	1,3	4,8	3,6	3,3
	Menos de 1 vez al mes	1,8 [b]	5,2	5,3	4,9
	Al menos 1 vez al mes	2,3	6,7	6,6	6,1
		p<0,05	*p<0,05*	*p<0,001*	*p<0,001*
8.Psicológica y/o económica (4+5+6+7)	No	6,6	8,5	9,2	8,5
	Menos de 1 vez al mes	14,1	11,3	18,3	16,8
	Al menos 1 vez al mes	15,6	17,6	22,6	20,6
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
9.Violencia total (3+8)	No	6,8	9,0	9,6	8,9
	Menos de 1 vez al mes	14,9	12,6	19,8	18,1
	Al menos 1 vez al mes	16,1	19,3	24,2	22,1
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*

1. Porcentaje sobre el total de mujeres con pareja actual en cada categoría; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres con parejas pasadas en cada categoría; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han tenido pareja alguna vez en su vida en cada categoría; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
ns= no significativo.

La prevalencia de violencia ejercida por la pareja en los 12 meses previos a la entrevista es, en general, superior entre las mujeres que han consumido cannabis en los últimos 12 meses que entre aquellas que no lo han hecho (Tabla 6.19). Esta pauta se observa para prácticamente todos los tipos de violencia analizados y en los distintos tipos de pareja considerados, siendo las prevalencias generalmente más elevadas entre quienes declaran un consumo más frecuente. Por ejemplo, entre las mujeres que han tenido pareja alguna vez en la vida, la prevalencia de violencia total pasa del 12,1 % entre quienes no han consumido cannabis al 25,5 % entre quienes lo han consumido menos de una vez al mes y al 40,0 % entre quienes lo han hecho al menos una vez al mes.

Tabla 6.19 Prevalencia de violencia ejercida por la pareja (actual o pasada) en los 12 meses previos a la entrevista, por tipo de violencia, según consumo de cannabis en los últimos 12 meses (%)

		Pareja actual[1]	Parejas pasadas[2]	Cualquier pareja[3]	Total de mujeres[4]
1. Física	No	0,4	2,0	1,5	1,4
	Menos de 1 vez al mes	.	.	.	.
	Al menos 1 vez al mes	.	6,3 [b]	9,4 [b]	8,6 [b]
			p<0,01	*p<0,001^*	*p<0,001^*
2. Sexual	No	1,0	1,7	1,8	1,6
	Menos de 1 vez al mes	.	.	5,6 [b]	5,1 [b]
	Al menos 1 vez al mes	.	8,3 [b]	10,7 [b]	9,7 [b]
			*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001^*
3. Física y/o sexual (1+2)	No	1,3	3,0	2,8	2,6
	Menos de 1 vez al mes	.	4,7 [b]	7,3 [b]	6,6 [b]
	Al menos 1 vez al mes	.	11,9 [b]	15,7	14,2
			*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001^*
4.Emocional	No	5,2	5,8	7,0	6,4
	Menos de 1 vez al mes	12,1 [b]	10,9 [b]	15,7	14,1
	Al menos 1 vez al mes	17,1 [b]	22,3 [b]	27,3	24,8
		*p<0,001^*	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
5.Control	No	5,1	2,2	4,9	4,5
	Menos de 1 vez al mes	11,2 [b]	7,8 [b]	12,9 [b]	11,6 [b]
	Al menos 1 vez al mes	17,8 [b]	17,6	25,1	22,8
		*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001*	*p<0,001*
6.Económica	No	2,3	0,9	2,1	2,0
	Menos de 1 vez al mes	.	.	.	.
	Al menos 1 vez al mes	.	4,4 [b]	5,0 [b]	4,6 [b]
			*p<0,01^*	*p<0,05^*	*p<0,05^*
7.Miedo	No	1,5	4,9	4,0	3,7
	Menos de 1 vez al mes	.	9,0 [b]	8,7 [b]	7,9 [b]
	Al menos 1 vez al mes	.	13,8 [b]	14,2 [b]	12,8 [b]
			p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*
8.Psicológica y/o económica (4+5+6+7)	No	8,5	9,7	11,4	10,5
	Menos de 1 vez al mes	17,2 [b]	18,5	23,3	21,0
	Al menos 1 vez al mes	22,7 [b]	31,2	37,7	34,2
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
9.Violencia total (3+8)	No	8,7	10,6	12,1	11,1
	Menos de 1 vez al mes	19,1 [b]	20,2	25,5	23,0
	Al menos 1 vez al mes	24,5 [b]	32,7	40,0	36,3
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*

1. Porcentaje sobre el total de mujeres con pareja actual en cada categoría; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres con parejas pasadas en cada categoría; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han tenido pareja alguna vez en su vida en cada categoría; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada categoría.

El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

ns= no significativo.

^ En más del 20 % de las casillas los recuentos esperados son inferiores a 5, por lo que el contraste χ^2 puede no ser válido.

La prevalencia de violencia ejercida por la pareja en los 12 meses previos a la entrevista es, en general, superior entre las mujeres que han consumido otras drogas en los últimos 12 meses que entre aquellas que no lo han hecho (Tabla 6.20). Este patrón se observa para prácticamente todos los tipos de violencia analizados y en los distintos tipos de pareja considerados. Entre las mujeres que han tenido pareja alguna vez en la vida, la prevalencia de violencia total alcanza el 32,5 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 12,4 % entre las no consumidoras. No obstante, algunos resultados deben interpretarse con cautela debido al reducido número de casos en determinadas categorías de consumo.

Tabla 6.20 Prevalencia de violencia ejercida por la pareja (actual o pasada) en los 12 meses previos a la entrevista, por tipo de violencia, según consumo de otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Pareja actual[1]	Parejas pasadas[2]	Cualquier pareja[3]	Total de mujeres[4]
1. Física	No	0,5	2,0	1,6	1,5
	Sí	.	7,6 [b]	10,8 [b]	10,0 [b]
			*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001^*
2. Sexual	No	1,1	1,8	1,9	1,8
	Sí	.	.	6,5 [b]	6,0 [b]
				*p<0,01^*	*p<0,01^*
3. Física y/o sexual (1+2)	No	1,4	3,2	2,9	2,7
	Sí	.	11,6 [b]	14,6 [b]	13,5 [b]
			*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001^*
4.Emocional	No	5,3	6,1	7,3	6,7
	Sí	14,3 [b]	18,8 [b]	24,8	23,0
		*p<0,01^*	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
5.Control	No	5,2	2,5	5,1	4,7
	Sí	11,6 [b]	10,9 [b]	17,9 [b]	16,6 [b]
		*p<0,05^*	*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001^*
6.Económica	No	2,3	1,0	2,2	2,0
	Sí	.	.	.	.
7.Miedo	No	1,5	5,0	4,1 [b]	3,8 [b]
	Sí	.	14,0 [b]	14,5 [b]	13,4 [b]
			*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001^*
8.Psicológica y/o económica (4+5+6+7)	No	8,6	10,1	11,8	10,8
	Sí	21,3 [b]	23,8	31,1	28,8
		*p<0,01^*	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
9.Violencia total (3+8)	No	8,9	11,0	12,4	11,4
	Sí	21,3 [b]	25,2	32,5	30,1
		p<0,01	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*

1. Porcentaje sobre el total de mujeres con pareja actual en cada categoría; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres con parejas pasadas en cada categoría; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han tenido pareja alguna vez en su vida en cada categoría; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).
ns= no significativo.
^ En más del 20 % de las casillas los recuentos esperados son inferiores a 5, por lo que el contraste χ^2 puede no ser válido.

3.4 Denuncia y búsqueda de ayuda formal e informal como consecuencia de la violencia en la pareja

La denuncia de la violencia de pareja (violencia física, sexual, emocional o miedo - VFSEM, en adelante) en la policía o el juzgado muestra pocas diferencias según el consumo de sustancias. No obstante, las mujeres que no han realizado consumos excesivos de alcohol presentan porcentajes de denuncia superiores a los observados entre quienes sí los han realizado. Entre las

mujeres que han sufrido violencia por cualquier pareja, el porcentaje de denuncia es del 19,4 % entre quienes no han consumido alcohol en exceso, frente al 12,2 % y al 12,8 % entre quienes lo han hecho menos de una vez al mes y al menos una vez al mes, respectivamente. En el caso del cannabis y de otras drogas también se observan porcentajes de denuncia inferiores entre las consumidoras. Sin embargo, el reducido tamaño muestral en estas categorías limita la robustez de las estimaciones y las diferencias observadas no resultan estadísticamente significativas para el conjunto de mujeres que han sufrido violencia por cualquier pareja (Tabla 6.21).

Las diferencias observadas en los porcentajes de denuncia podrían estar relacionadas, al menos parcialmente, con la distinta estructura de edad de consumidoras y no consumidoras, dado que las mujeres que consumen sustancias presentan perfiles de edad significativamente más jóvenes.

Tabla 6.21 Denuncia de la violencia (VFSEM) de la pareja en la policía o el juzgado, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Parejas pasadas[1]	Cualquier pareja[2]
Alcohol (consumo excesivo)	No	22,1	19,4
	Menos de 1 vez al mes	14,3	12,2
	Al menos 1 vez al mes	14,3	12,8
		p<0,001	*p<0,001*
Cannabis, marihuana o hachís	No	19,8	17,3
	Menos de 1 vez al mes	.	.
	Al menos 1 vez al mes	12,9 [b]	13,4 [b]
		p<0,05	*ns*
Otras drogas	No	19,2	16,9
	Sí	12,7 [b]	11,9 [b]
		ns	*ns*

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido VFSEM de parejas pasadas en cada categoría; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido VFSEM de cualquier pareja en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).
ns= no significativo.

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la búsqueda de ayuda formal o informal ante la violencia ejercida por la pareja según el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses. Tampoco se observan diferencias estadísticamente significativas cuando se analizan de forma conjunta las mujeres que han denunciado, han buscado ayuda formal o han hablado de la violencia con personas de su entorno[2].

[2] Resultados no mostrados en tabla.

3.5 Ruptura de la relación debido a la violencia de la pareja

En lo que se refiere a la ruptura de la relación con alguna pareja pasada debido a la violencia, las diferencias solo resultan estadísticamente significativas según el consumo excesivo de alcohol. No obstante, estas diferencias se observan exclusivamente en la categoría de respuesta "Terminaron los comportamientos porque la expareja falleció" (4,8 % entre las mujeres que no han consumido alcohol en exceso en los últimos 12 meses, frente al 1,8 % y 2,5 % entre quienes lo han consumido en exceso menos de una vez al mes y al menos una vez al mes, respectivamente). Este resultado sugiere que las diferencias observadas podrían estar relacionadas con la distinta estructura de edad de consumidoras y no consumidoras, más que con el consumo de alcohol en sí mismo[3].

3.6 Consecuencias físicas, psíquicas y laborales de la violencia en la pareja

3.6.1 Lesiones físicas

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de lesiones físicas como consecuencia de la violencia física o sexual por parte de la pareja según el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses[4].

3.6.2 Consecuencias psicológicas

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la presencia de consecuencias psicológicas derivadas de la violencia de pareja (VFSEM) según el consumo excesivo de alcohol. En cambio, entre las mujeres que han sufrido violencia ejercida por cualquier pareja, la proporción que declara consecuencias psicológicas es superior entre las consumidoras de cannabis y de otras drogas que entre las no consumidoras. Así, las consecuencias psicológicas afectan al 72,8 % de las mujeres que han sufrido VFSEM y no han consumido cannabis, frente al 81,4 % y 85,6 % de quienes lo han consumido menos de una vez al mes y al menos una vez al mes, respectivamente. Del mismo modo, el porcentaje asciende del 73,2 % entre las mujeres que no han consumido otras drogas al 86,8 % entre quienes sí las han consumido (Tabla 6.22).

[3] Resultados no mostrados en tabla.
[4] Resultados no mostrados en tabla.

Tabla 6.22 Consecuencias psicológicas de la violencia (VFSEM) de la pareja, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Pareja actual[1]	Parejas pasadas[2]	Cualquier pareja[3]
Alcohol (consumo excesivo)	No	55,6	76,1	72,8
	Menos de 1 vez al mes	52,7	75,4	71,6
	Al menos 1 vez al mes	51,5	80,2	76,5
		ns	*ns*	*ns*
Cannabis, marihuana o hachís	No	53,8	76,5	72,8
	Menos de 1 vez al mes	72,1 [b]	82,8	81,4
	Al menos 1 vez al mes	66,3 [b]	86,9	85,6
		ns	*ns*	*p<0,05*
Otras drogas	No	54,8	76,7	73,2
	Sí	49,2 [b]	88,3	86,8
		ns	*ns*	*p<0,05*

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja actual en cada categoría; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido VFSEM de parejas pasadas en cada categoría; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido VFSEM de cualquier pareja en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
ns= no significativo.

3.6.3 Secuelas físicas y/o psicológicas en la actualidad como consecuencia de la VFSEM de alguna pareja

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la presencia de secuelas físicas y/o psicológicas en la actualidad derivadas de la violencia de pareja (VFSEM) según el consumo excesivo de alcohol. En cambio, entre las mujeres que han sufrido VFSEM, la presencia de secuelas es más frecuente entre las consumidoras de cannabis y de otras drogas que entre las no consumidoras. Así, la proporción de mujeres que presentan secuelas asciende del 31,7 % entre quienes no han consumido cannabis al 38,2 % entre quienes lo han consumido menos de una vez al mes y al 53,9 % entre quienes lo han hecho al menos una vez al mes. Del mismo modo, el porcentaje aumenta del 32,2 % entre las mujeres que no han consumido otras drogas al 49,3 % entre quienes sí las han consumido (Tabla 6.23).

Tabla 6.23 Secuelas físicas y/o psicológicas en la actualidad como consecuencia de la VFSEM de alguna pareja, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Secuelas (entre mujeres con lesiones o consecuencias psicológicas) [1]	Secuelas (entre mujeres que han sufrido VFSEM)[2]
Alcohol (consumo excesivo)	No	43,3	32,5
	Menos de 1 vez al mes	42,7	32,1
	Al menos 1 vez al mes	42,7	33,3
		ns	*ns*
Cannabis, marihuana o hachís	No	42,1	31,7
	Menos de 1 vez al mes	46,2	38,2
	Al menos 1 vez al mes	63,0	53,9
		p<0,01	*p<0,001*
Otras drogas	No	42,6	32,2
	Sí	56,8	49,3
		ns	*p<0,01*

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido VFSEM de cualquier pareja y han tenido lesiones físicas o consecuencias psicológicas tras los episodios de violencia en cada categoría; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido VFSEM de cualquier pareja en cada categoría.

3.6.4 Consumo de sustancias

No se observan diferencias estadísticamente significativas en el consumo de sustancias (medicamentos, alcohol u otras drogas) para afrontar los episodios de violencia de pareja (VFSEM) según el consumo excesivo de alcohol en los últimos 12 meses. En cambio, entre las mujeres que han sufrido VFSEM ejercida por parejas pasadas o por cualquier pareja, el recurso al consumo de sustancias como estrategia de afrontamiento es más frecuente entre las consumidoras de cannabis y de otras drogas que entre las no consumidoras. Así, entre las mujeres que han sufrido violencia ejercida por cualquier pareja, el porcentaje que declara haber consumido sustancias para afrontar los episodios de violencia pasa del 24,2 % entre quienes no han consumido cannabis al 35,7 % y al 41,8 % entre quienes lo han consumido menos de una vez al mes y al menos una vez al mes, respectivamente. Del mismo modo, dicho porcentaje aumenta del 24,5 % entre las mujeres que no han consumido otras drogas al 47,2 % entre quienes sí las han consumido (Tabla 6.24).

Tabla 6.24 Consumo de sustancias (medicamentos, alcohol o drogas) para afrontar los episodios de (VFSEM) de la pareja, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Pareja actual[1]	Parejas pasadas[2]	Cualquier pareja[3]
Alcohol (consumo excesivo)	No	12,7	26,7	24,3
	Menos de 1 vez al mes	14,8 [b]	27,9	25,9
	Al menos 1 vez al mes	16,7	29,1	27,1
		ns	*ns*	*ns*
Cannabis, marihuana o hachís	No	13,5	26,4	24,2
	Menos de 1 vez al mes	.	37,6	35,7
	Al menos 1 vez al mes	.	43,1	41,8
			p<0,001	*p<0,001*
Otras drogas	No	13,8	26,7	24,5
	Sí	.	49,2	47,2
		ns	*p<0,001*	*p<0,001*

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja actual en cada categoría; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido VFSEM de parejas pasadas en cada categoría; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido VFSEM de cualquier pareja en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

3.6.5 Absentismo laboral como consecuencia de la violencia en la pareja

No se observan diferencias estadísticamente significativas en el absentismo laboral como consecuencia de la violencia de pareja (VFSEM) según el consumo de otras drogas en los últimos 12 meses. No obstante, la proporción de mujeres que declara absentismo laboral es superior entre las consumidoras de otras drogas (22,2 %) que entre las no consumidoras (12,6 %), por lo que la ausencia de significación estadística podría estar relacionada con el reducido tamaño muestral de este grupo. En cambio, entre las mujeres que han sufrido violencia ejercida por parejas pasadas o por cualquier pareja, se observan diferencias según el consumo excesivo de alcohol y de cannabis. Por otra parte, mientras que en el caso del alcohol las diferencias no muestran un patrón consistente, entre las consumidoras de cannabis el absentismo laboral es más frecuente, especialmente entre quienes declaran un consumo al menos mensual. Así, entre las mujeres que han sufrido violencia ejercida por cualquier pareja, el porcentaje que declara absentismo laboral pasa del 12,3 % entre las no consumidoras de cannabis al 27,4 % entre quienes lo consumen al menos una vez al mes (Tabla 6.25).

Tabla 6.25 Absentismo laboral como consecuencia de la violencia (VFSEM) de la pareja, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Pareja actual[1]	Parejas pasadas[2]	Cualquier pareja[3]
Alcohol (consumo excesivo)	No	5,1	14,8	13,3
	Menos de 1 vez al mes	6,0 [b]	16,7	14,9
	Al menos 1 vez al mes	.	12,2	10,7
		ns	*p<0,01*	*p<0,01*
Cannabis, marihuana o hachís	No	4,5	13,7	12,3
	Menos de 1 vez al mes	.	15,8 [b]	14,5 [b]
	Al menos 1 vez al mes	.	29,3	27,4
			p<0,001	*p<0,001*
Otras drogas	No	4,4	14,0	12,6
	Sí	.	23,8 [b]	22,2 [b]
			ns	*ns*

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido VFSEM de la pareja actual en cada categoría; 2. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido VFSEM de parejas pasadas en cada categoría; 3. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido VFSEM de cualquier pareja en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).
ns= no significativo.

4 Violencia física fuera de la pareja

4.1 Prevalencia de la violencia física fuera de la pareja

La prevalencia de violencia física fuera de la pareja es superior entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso, o que han consumido cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses que entre aquellas que no lo han hecho. Esta pauta se observa tanto para la violencia sufrida a lo largo de la vida como en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y durante la infancia. Las diferencias son especialmente acusadas en el caso del cannabis y de las otras drogas. Así, la prevalencia de violencia física fuera de la pareja a lo largo de la vida alcanza el 50,4 % entre las mujeres que han consumido cannabis al menos una vez al mes y el 45,4 % entre quienes han consumido otras drogas, frente al 13,4 % y el 13,9 %, respectivamente, entre las no consumidoras. Del mismo modo, la prevalencia de violencia física sufrida durante la infancia asciende al 34,8 % entre las consumidoras más frecuentes de cannabis y al 37,8 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 10,2 % y 10,5 % observados entre las no consumidoras (Tabla 6.26).

Los resultados referidos a la violencia sufrida en los últimos 4 años y en los últimos 12 meses para las categorías de consumo de cannabis y otras drogas deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño muestral de algunas categorías.

Tabla 6.26 Prevalencia de la violencia física fuera de la pareja a lo largo de la vida, en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y en la infancia, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		A lo largo de la vida	Últimos 4 años	Últimos 12 meses	Infancia
Alcohol (consumo excesivo)	No	11,5	1,4	0,8	8,8
	Menos de 1 vez al mes	24,1	3,4	2,2	18,8
	Al menos 1 vez al mes	22,5	5,2	2,7	16,7
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
Cannabis, marihuana o hachís	No	13,4	1,9	1,1	10,2
	Menos de 1 vez al mes	41,9	14,4 [b]	6,0 [b]	37,4
	Al menos 1 vez al mes	50,4	11,6 [b]	6,5 [b]	34,8
		p<0,001	*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001*
Otras drogas	No	13,9	2,1	1,1	10,5
	Sí	45,4	11,7 [b]	7,0 [b]	37,8
		p<0,001	*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001*

Porcentajes sobre el total de mujeres en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
ns= no significativo.
^ En más del 20 % de las casillas los recuentos esperados son inferiores a 5, por lo que el contraste χ^2 puede no ser válido.

4.2 Frecuencia de la violencia y número de agresores

La frecuencia de la violencia física fuera de la pareja y el número de personas agresoras no presentan diferencias estadísticamente significativas según el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses.

4.3 Denuncia y búsqueda de ayuda

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la denuncia de la violencia física fuera de la pareja según el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses. Tampoco se observan diferencias en la búsqueda de ayuda formal según el consumo excesivo de alcohol o el consumo de otras drogas. En cambio, entre las mujeres consumidoras de cannabis se registran porcentajes significativamente más elevados de búsqueda de ayuda formal e informal. Así, entre las mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja, el porcentaje que recurrió a ayuda formal aumenta del 17,0 % entre las no consumidoras de cannabis al 30,7 % entre quienes consumen cannabis al menos una vez al mes, mientras que el recurso a ayuda informal pasa del 61,8 % al 77,0 %. Asimismo, la búsqueda de ayuda informal también es más frecuente entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso y entre las consumidoras de otras drogas. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres que recurrió a ayuda informal asciende al 69,6 % entre quienes han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes y al 78,2 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 59,9 % y 62,3 %, respectivamente, entre las no consumidoras. Del mismo modo, el indicador conjunto de

denuncia o búsqueda de ayuda formal o informal presenta porcentajes más elevados entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso y entre las consumidoras de cannabis (Tabla 6.27)

Tabla 6.27 Denuncia, búsqueda de ayuda formal o informal como consecuencia de la violencia física fuera de la pareja, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Denuncia	Ayuda formal	Ayuda informal	Denuncia o búsqueda de ayuda formal o informal
Alcohol (consumo excesivo)	No	10,2	18,1	59,9	63,7
	Menos de 1 vez al mes	7,6	15,5	66,4	68,3
	Al menos 1 vez al mes	12,1	18,8	69,6	72,3
		ns	*ns*	*p<0,01*	*p<0,05*
Cannabis, marihuana o hachís	No	10,2	17,0	61,8	65,1
	Menos de 1 vez al mes	.	27,5 [b]	68,8	71,1
	Al menos 1 vez al mes	15,9 [b]	30,7	77,0	80,0
		ns	*p<0,01*	*p<0,05*	*p<0,05*
Otras drogas	No	10,2	17,7	62,3	65,6
	Sí	.	26,6 [b]	78,2	78,2
			ns	*p<0,05*	*ns*

Porcentajes sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja a lo largo de la vida en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).
ns= no significativo.

4.4 Consecuencias de la violencia física fuera del ámbito de la pareja

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la presencia de lesiones físicas o consecuencias psicológicas derivadas de la violencia física fuera de la pareja según el consumo excesivo de alcohol en los últimos 12 meses. En cambio, entre las mujeres consumidoras de cannabis se registran porcentajes significativamente más elevados tanto de lesiones físicas como de consecuencias psicológicas. Así, la proporción de mujeres que sufrieron lesiones físicas aumenta del 45,4 % entre las no consumidoras de cannabis al 64,4 % entre quienes lo han consumido al menos una vez al mes en el último año, mientras que la presencia de consecuencias psicológicas pasa del 57,6 % al 72,7 %. Asimismo, las consecuencias psicológicas son más frecuentes entre las consumidoras de otras drogas que entre las no consumidoras (72,3 % frente a 58,4 %) (Tabla 6.28).

Tabla 6.28 Lesiones físicas y consecuencias psicológicas de la violencia física fuera del ámbito de la pareja, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Lesiones físicas	Consecuencias psicológicas
Alcohol (consumo excesivo)	No	47,3	58,1
	Menos de 1 vez al mes	42,3	59,6
	Al menos 1 vez al mes	46,7	60,0
		ns	*ns*
Cannabis, marihuana o hachís	No	45,4	57,6
	Menos de 1 vez al mes	50,8	73,6
	Al menos 1 vez al mes	64,4	72,7
		p<0,05	*p<0,001*
Otras drogas	No	46,4	58,4
	Sí	48,0	72,3
		ns	*p<0,05*

Porcentajes sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja a lo largo de la vida en cada categoría.
ns= no significativo.

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la presencia de secuelas actuales entre las mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja según el consumo excesivo de alcohol cuando se consideran las tres categorías de consumo por separado. No obstante, al agrupar las categorías de consumo excesivo de alcohol en una única categoría de consumidoras, las diferencias respecto a las no consumidoras resultan estadísticamente significativas[5]. En el caso del cannabis, la proporción de mujeres con secuelas entre quienes han sufrido violencia física fuera de la pareja aumenta del 24,7 % entre las no consumidoras al 39,7 % entre quienes consumen cannabis al menos una vez al mes, diferencia que resulta estadísticamente significativa. Por el contrario, no se observan diferencias estadísticamente significativas según el consumo de otras drogas, aunque las prevalencias observadas son más elevadas entre las consumidoras (34,6 % frente a 25,6 %), lo que podría estar relacionado con el reducido tamaño muestral de este grupo (Tabla 6.29).

[5] Al agrupar las categorías de consumo ("menos de una vez al mes" y "al menos una vez al mes"), las diferencias respecto a las no consumidoras resultan estadísticamente significativas (p<0,05).

Tabla 6.29 Secuelas en la actualidad como consecuencia de la violencia física fuera del ámbito de la pareja, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Secuelas (entre mujeres con lesiones o consecuencias psicológicas)[1]	Secuelas (entre mujeres que han sufrido VF)[2]
Alcohol (consumo excesivo)	No	39,4	27,5
	Menos de 1 vez al mes	30,7	22,1
	Al menos 1 vez al mes	32,8	23,2
		ns	*ns*
Cannabis, marihuana o hachís	No	35,8	24,7
	Menos de 1 vez al mes	43,1 [b]	34,1 [b]
	Al menos 1 vez al mes	46,9	39,7
		ns	*p<0,05*
Otras drogas	No	36,6	25,6
	Sí	42,6 [b]	34,6 [b]
		ns	*ns*

1. Porcentajes sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja a lo largo de la vida y tuvieron lesiones físicas o consecuencias psicológicas tras los episodios de violencia en cada categoría; 2. Porcentajes sobre el total de mujeres que han sufrido violencia física fuera de la pareja a lo largo de la vida en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
ns= no significativo.
VF= Violencia física

No se observan diferencias estadísticamente significativas en el absentismo laboral como consecuencia de la violencia física fuera de la pareja según el consumo excesivo de alcohol ni según el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses[6].

5 Violencia sexual fuera de la pareja

5.1 Prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja

La prevalencia de violencia sexual fuera de la pareja es superior entre las mujeres que han realizado consumos excesivos de alcohol y entre las consumidoras de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses que entre las no consumidoras (Tabla 6.30). Esta pauta se observa tanto para la violencia sufrida a lo largo de la vida como en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y durante la infancia. Así, la prevalencia de violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida alcanza el 28,3 % entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes, frente al 10,4 % entre quienes no lo han hecho. Las diferencias son aún más acusadas en el caso del cannabis y de las otras drogas alcanzando la prevalencia a lo largo de la vida el 48,8 % entre las mujeres que consumen cannabis al menos una vez al mes y el 66,8 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 13,6 % y el 13,9 %, respectivamente, entre las no

[6] Resultados no mostrados.

consumidoras. Esta mayor prevalencia también se observa para la violencia sexual sufrida en periodos más recientes. Así, la prevalencia en los cuatro años previos a la entrevista alcanza el 9,7 % entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes, el 16,2 % entre las consumidoras frecuentes de cannabis y el 26,3 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 1,9 %, 3,0 % y 3,2 %, respectivamente, entre las no consumidoras.

Del mismo modo, la prevalencia de violencia sexual sufrida durante la infancia asciende al 14,9 % entre las que han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes, al 28,7 % entre las consumidoras frecuentes de cannabis y al 35,6 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 5,4 %, 6,9 % y el 7,2 %, respectivamente, entre las no consumidoras.

Tabla 6.30 Prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida, en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y en la infancia, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		A lo largo de la vida	Últimos 4 años	Últimos 12 meses	Infancia
Alcohol (consumo excesivo)	No	10,4	1,9	1,1	5,4
	Menos de 1 vez al mes	27,0	6,7	3,7	13,6
	Al menos 1 vez al mes	28,3	9,7	5,3	14,9
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
Cannabis, marihuana o hachís	No	13,6	3,0	1,7	6,9
	Menos de 1 vez al mes	46,2	22,9	9,3 [b]	24,4
	Al menos 1 vez al mes	48,8	16,2	10,3 [b]	28,7
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001^*	*p<0,001*
Otras drogas	No	13,9	3,2	1,8	7,2
	Sí	66,8	26,3	16,2 [b]	35,6
		p<0,001	*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001*

Porcentajes sobre el total de mujeres en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
ns= no significativo.
^ En más del 20 % de las casillas los recuentos esperados son inferiores a 5, por lo que el contraste χ^2 puede no ser válido.

La prevalencia de las violaciones fuera de la pareja es bastante superior entre las mujeres que han realizado consumos excesivos de alcohol y entre las consumidoras de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses que entre las no consumidoras (Tabla 6.31). Esta pauta se observa tanto para las violaciones sufridas a lo largo de la vida como en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y durante la infancia. Así, la prevalencia de violaciones fuera de la pareja a lo largo de la vida alcanza el 6,8 % entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes, frente al 2,1 % entre quienes no lo han hecho. Las diferencias son más acusadas en el caso del cannabis y de las otras drogas, alcanzando la prevalencia a lo largo de la vida el 21,4 % entre las consumidoras frecuentes de cannabis y el 23,4 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 2,7 % y el 2,9 %, respectivamente, entre las no consumidoras. Del mismo modo, la prevalencia de violaciones sufridas durante la infancia asciende al 2,4 % entre las mujeres que

han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes, al 6,9 % entre las consumidoras frecuentes de cannabis y al 7,2 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 0,8 %, 1,1 % y 1,1 %, respectivamente, entre las no consumidoras. Esta mayor prevalencia también se observa para las violaciones sufridas en los cuatro años previos a la entrevista, si bien estos resultados y los de las violaciones en la infancia deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño muestral de algunas categorías de consumo.

Tabla 6.31 Prevalencia de las violaciones fuera de la pareja a lo largo de la vida, en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y en la infancia, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		A lo largo de la vida	Últimos 4 años	Últimos 12 meses	Infancia
Alcohol (consumo excesivo)	No	2,1	0,5	0,3	0,8
	Menos de 1 vez al mes	6,0	1,6 [b]	0,9 [b]	2,3
	Al menos 1 vez al mes	6,8	2,6	1,4	2,4
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
Cannabis, marihuana o hachís	No	2,7	0,7	0,4	1,1
	Menos de 1 vez al mes	13,5 [b]	7,6 [b]	4,0 [b]	5,5 [b]
	Al menos 1 vez al mes	21,4	7,5 [b]	.	6,9 [b]
		p<0,001	*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001^*
Otras drogas	No	2,9	0,8	0,4	1,1
	Sí	23,4	8,0 [b]	.	7,2 [b]
		*p<0,001^*	*p<0,001^*		*p<0,001^*

Porcentajes sobre el total de mujeres en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).
ns= no significativo.
^ En más del 20 % de las casillas los recuentos esperados son inferiores a 5, por lo que el contraste χ^2 puede no ser válido.

La prevalencia de los intentos de violación fuera de la pareja es superior entre las mujeres que han realizado consumos excesivos de alcohol y entre las consumidoras de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses que entre las no consumidoras (Tabla 6.32). Esta pauta se observa tanto para los intentos de violación sufridos a lo largo de la vida como en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y durante la infancia. Así, la prevalencia de intentos de violación fuera de la pareja a lo largo de la vida alcanza el 6,9 % entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes, frente al 2,2 % entre quienes no lo han hecho. Las diferencias son más acusadas en el caso del cannabis y de las otras drogas, alcanzando la prevalencia a lo largo de la vida el 17,4 % entre las consumidoras frecuentes de cannabis y el 15,2 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 2,8 % y el 3,0 %, respectivamente, entre las no consumidoras. Del mismo modo, la prevalencia de intentos de violación sufridos durante la infancia asciende al 2,6 % entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes y al 8,9 % entre las consumidoras frecuentes de cannabis, frente al 0,9 % y 1,1 %, respectivamente, entre las no consumidoras.

Tabla 6.32 Prevalencia de los intentos de violación fuera de la pareja a lo largo de la vida, en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y en la infancia, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		A lo largo de la vida	Últimos 4 años	Últimos 12 meses	Infancia
Alcohol (consumo excesivo)	No	2,2	0,4	0,2 [b]	0,9
	Menos de 1 vez al mes	5,8	1,5 [b]	1,1 [b]	1,9 [b]
	Al menos 1 vez al mes	6,9	2,1	0,8 [b]	2,6
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
Cannabis, marihuana o hachís	No	2,8	0,7	0,3	1,1
	Menos de 1 vez al mes	14,0 [b]	.	.	5,3 [b]
	Al menos 1 vez al mes	17,4	3,1 [b]	.	8,9 [b]
		p<0,001	*p<0,001^*		*p<0,001^*
Otras drogas	No	3,0	0,7	0,3	1,2
	Sí	15,2 [b]	.	.	.
		*p<0,001^*			

Porcentajes sobre el total de mujeres en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).
ns= no significativo.
^ En más del 20 % de las casillas los recuentos esperados son inferiores a 5, por lo que el contraste χ^2 puede no ser válido.

Las otras formas de violencia sexual fuera de la pareja distintas de las violaciones y de los intentos de violación presentan un patrón muy similar al observado para el conjunto de la violencia sexual. Dado que este tipo de violencia constituye la forma más frecuente de violencia sexual fuera de la pareja, concentra la mayor parte de los casos incluidos en el indicador global de violencia sexual (Tabla 6.33).

Tabla 6.33 Prevalencia de otras formas de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja distintas de la violación y de los intentos de violación a lo largo de la vida, en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y en la infancia, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		A lo largo de la vida	Últimos 4 años	Últimos 12 meses	Infancia
Alcohol (consumo excesivo)	No	9,1	1,4	0,8	4,7
	Menos de 1 vez al mes	25,0	6,0	2,7	12,1
	Al menos 1 vez al mes	25,6	8,0	4,4	13,9
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
Cannabis, marihuana o hachís	No	12,2	2,4	1,3	6,3
	Menos de 1 vez al mes	36,6	17,9	6,0 [b]	20,1
	Al menos 1 vez al mes	43,0	14,6	9,3 [b]	26,5
		p<0,001	*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001*
Otras drogas	No	12,5	2,6	1,4	6,5
	Sí	62,8	23,4	13,8 [b]	34,0
		p<0,001	*p<0,001^*	*p<0,001^*	*p<0,001^*

Porcentajes sobre el total de mujeres en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
ns= no significativo.
^ En más del 20 % de las casillas los recuentos esperados son inferiores a 5, por lo que el contraste χ^2 puede no ser válido.

5.2 Frecuencia de la violencia y número de agresores

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia con la que se han padecido violaciones o intentos de violación fuera de la pareja según el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses, si bien estos resultados pueden estar condicionados por el reducido tamaño muestral de algunas categorías de consumo. Sí se observan diferencias en la frecuencia con la que se han sufrido las otras formas de violencia sexual, siendo más frecuente la repetición de los episodios entre las consumidoras que entre las no consumidoras. Así, entre las mujeres que consumen cannabis al menos una vez al mes, el 81,0 % declara haber sufrido otras formas de violencia sexual en más de una ocasión, frente al 53,3 % de las no consumidoras. Este porcentaje alcanza el 68,2 % entre las consumidoras de otras drogas y el 61,4 % entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes[7]. Tampoco se observan diferencias estadísticamente significativas en el número de agresores según el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses.

5.3 Vínculo existente con la persona agresora

Para el conjunto de la violencia sexual fuera de la pareja, no hay diferencias relevantes según el consumo excesivo de alcohol en relación con los agresores mencionados (familiar, conocido o desconocido). Para el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses sí se aprecian

[7] Resultados no mostrados en tabla.

algunas diferencias descriptivas[8], en concreto, el mayor porcentaje de mujeres consumidoras que mencionan como agresor a un hombre conocido (65,1 % entre las consumidoras de cannabis y 78,1 % entre las consumidoras de otras drogas, frente a 53,3 % y 53,5 %, respectivamente entre las no consumidoras) o desconocido (61,3 % entre las consumidoras de otras drogas, frente a 43,1 % entre las no consumidoras)[9].

5.4 Denuncia y búsqueda de ayuda

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la denuncia ni en la búsqueda de ayuda formal o informal según el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses. Del mismo modo, tampoco se identifican diferencias estadísticamente significativas en el indicador conjunto que considera a las mujeres que han denunciado la violencia, han buscado ayuda formal o han hablado de ella con personas de su entorno[10].

5.5 Consecuencias de la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja

5.5.1 Lesiones físicas y consecuencias psicológicas

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la presencia de lesiones físicas derivadas de la violencia sexual fuera de la pareja según el consumo excesivo de alcohol. En el caso del consumo de cannabis y de otras drogas se observan porcentajes algo más elevados de mujeres que declaran haber sufrido lesiones, aunque estos resultados deben interpretarse con cautela debido al reducido número de casos. Tampoco se observan diferencias consistentes en las consecuencias psicológicas derivadas de la violencia sexual fuera de la pareja según el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses[11].

5.5.2 Secuelas físicas y/o psicológicas en la actualidad como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja

No se observan diferencias estadísticamente significativas en las secuelas actuales derivadas de la violencia sexual fuera de la pareja según el consumo excesivo de alcohol ni según el consumo de otras drogas en los últimos 12 meses. En cambio, entre las consumidoras de cannabis se registran porcentajes más elevados de mujeres con secuelas. Así, entre las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja y tuvieron lesiones físicas o consecuencias psicológicas tras los episodios de violencia, el porcentaje que presenta secuelas asciende al 53,5 % entre quienes consumen cannabis al menos una vez al mes, frente al 35,2 % entre las no consumidoras. Del mismo modo, cuando se considera el conjunto de mujeres que han sufrido violencia sexual, la prevalencia de secuelas alcanza el 38,4 % entre las consumidoras frecuentes de cannabis, frente al 18,9 % entre las no consumidoras[12].

5.5.3 Consumo de sustancias

El consumo de sustancias (medicamentos, alcohol o drogas) para afrontar los episodios de violencia sexual fuera de la pareja es más frecuente entre las mujeres que han realizado

[8] Dado el reducido número de casos en algunas categorías de respuesta y el carácter multirrespuesta de la variable, los resultados deben interpretarse con cautela
[9] Resultados no mostrados en tabla.
[10] Resultados no mostrados en tabla.
[11] Resultados no mostrados en tabla.
[12] Resultado no mostrado en tabla.

consumos excesivos de alcohol y entre las consumidoras de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses que entre las no consumidoras. Las diferencias son especialmente acusadas en el caso del cannabis. Así, entre las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, el porcentaje que declara haber recurrido al consumo de sustancias para afrontar los episodios pasa del 7,4 % entre las no consumidoras de cannabis al 28,9 % entre quienes consumen cannabis al menos una vez al mes. Del mismo modo, dicho porcentaje aumenta del 8,0 % al 23,2 % entre las consumidoras de otras drogas y del 6,7 % al 12,3 % entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes (Tabla 6.34).

En general, la misma pauta se observa para los distintos tipos de violencia sexual analizados por separado, aunque estos resultados deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño muestral de algunas categorías de consumo.

Tabla 6.34 Consumo de sustancias (medicamentos, alcohol o drogas) para afrontar los episodios de violencia sexual fuera la pareja, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Violencia sexual (total)[1]	Violaciones[2]	Intentos de violación[3]	Otras formas de violencia sexual[4]
Alcohol (consumo excesivo)	No	6,7	18,4	16,2	5,0
	Menos de 1 vez al mes	10,2	23,4 [b]	19,0 [b]	8,2
	Al menos 1 vez al mes	12,3	25,9	21,9	8,8
		p<0,01	*ns*	*ns*	*p<0,05*
Cannabis, marihuana o hachís	No	7,4	19,5	14,9	5,7
	Menos de 1 vez al mes	16,1 [b]	.	47,3 [b]	.
	Al menos 1 vez al mes	28,9	31,7 [b]	37,7 [b]	23,4
		p<0,001	*ns*	*p<0,001*	*p<0,001^*
Otras drogas	No	8,0	19,5	17,0	6,3
	Sí	23,2 [b]	34,7 [b]	.	17,1 [b]
		p<0,001	*ns*		*p<0,001^*

1. Porcentaje sobre mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja en cada categoría; 2. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido una violación fuera de la pareja; 3. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido un intento de violación fuera de la pareja; 4. Porcentaje sobre el total de mujeres que han sufrido otras formas de violencia sexual fuera de la pareja distintas de las violaciones y de los intentos de violación.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).
ns= no significativo.
^ En más del 20 % de las casillas los recuentos esperados son inferiores a 5, por lo que el contraste χ^2 puede no ser válido.

5.5.4 Absentismo laboral como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja

No se observan diferencias estadísticamente significativas en el absentismo laboral como consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja según el consumo excesivo de alcohol ni según el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses[13].

[13] Resultados no mostrados.

6 Acoso sexual

6.1 Prevalencia del acoso sexual

La prevalencia del acoso sexual es superior entre las mujeres que han realizado consumos excesivos de alcohol y entre las consumidoras de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses que entre las no consumidoras (Tabla 6.35). Esta pauta se observa tanto para el acoso sexual sufrido a lo largo de la vida como en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y durante la infancia. Así, la prevalencia de acoso sexual a lo largo de la vida alcanza el 61,6 % entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes, frente al 29,2 % entre quienes no lo han hecho. Las diferencias son aún más acusadas en el caso del cannabis y de las otras drogas, alcanzando la prevalencia a lo largo de la vida el 77,8 % entre las consumidoras frecuentes de cannabis y el 85,5 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 35,1 % y el 35,8 %, respectivamente, entre las no consumidoras.

Del mismo modo, la prevalencia de acoso sexual durante la infancia asciende al 31,5 % entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes, al 52,5 % entre las consumidoras frecuentes de cannabis y al 67,6 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 11,9 %, 15,1 % y 15,7 %, respectivamente, entre las no consumidoras. La misma pauta se observa para el acoso sexual sufrido en los últimos 4 años y en los últimos 12 meses.

Tabla 6.35 Prevalencia del acoso sexual a lo largo de la vida, en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y en la infancia, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		A lo largo de la vida	Últimos 4 años	Últimos 12 meses	Infancia
Alcohol (consumo excesivo)	No	29,2	12,0	8,0	11,9
	Menos de 1 vez al mes	56,8	35,0	25,6	28,5
	Al menos 1 vez al mes	61,6	37,7	29,6	31,5
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
Cannabis, marihuana o hachís	No	35,1	16,6	11,7	15,1
	Menos de 1 vez al mes	81,8	68,8	55,5	60,9
	Al menos 1 vez al mes	77,8	56,7	48,5	52,5
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
Otras drogas	No	35,8	17,3	12,4	15,7
	Sí	85,5	70,8	55,0	67,6
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*

Porcentajes sobre el total de mujeres en cada categoría.

6.2 Frecuencia del acoso y número de agresores

Entre las mujeres que han sufrido acoso sexual, la repetición de los episodios es más frecuente entre quienes han realizado consumos excesivos de alcohol y entre las consumidoras de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses que entre las no consumidoras (Tabla 6.36). Así, el porcentaje de mujeres que declara haber sufrido acoso sexual en más de una ocasión alcanza el 66,5 % entre quienes han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes, frente al 62,3 % entre quienes no lo han hecho. Las diferencias son más acusadas en el caso del cannabis y de las

otras drogas: el 80,0 % de las consumidoras frecuentes de cannabis y el 82,7 % de las consumidoras de otras drogas declaran haber sufrido episodios repetidos de acoso sexual, frente al 63,8 % y el 64,2 %, respectivamente, entre las no consumidoras.

Tabla 6.36 Distribución de las mujeres que han sufrido acoso sexual, según si ha sucedido una vez o más de una vez, por consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Una vez	Más de una vez	NC
Alcohol (consumo excesivo)	No	32,3	62,3	5,4
	Menos de 1 vez al mes	24,4	70,9	4,7
	Al menos 1 vez al mes	27,1	66,5	6,4
p<0,001				
Cannabis, marihuana o hachís	No	30,4	63,8	5,8
	Menos de 1 vez al mes	22,9	75,0	.
	Al menos 1 vez al mes	16,7 [b]	80,0	.
p<0,01				
Otras drogas	No	30,1	64,2	5,7
	Sí	12,8 [b]	82,7	.
p<0,01				

Porcentajes sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

Asimismo, las mujeres consumidoras de alcohol y otras drogas señalan con mayor frecuencia que en los episodios de acoso sexual participó más de una persona agresora (Tabla 6.37): esta situación es mencionada por el 34,0 % de las consumidoras de otras drogas y por el 27,9 % de las mujeres que han consumido alcohol en exceso menos de una vez al mes, frente al 24,2 % y 22,8 %, respectivamente, entre las no consumidoras. En el caso del cannabis, los resultados son menos homogéneos, aunque también se observan diferencias estadísticamente significativas.

Tabla 6.37 Distribución de las mujeres que han sufrido acoso sexual según si en la agresión participaron una o varias personas, por consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Solo lo/s realizó una persona	Al menos en una ocasión participó más de una persona (varias personas)	NC
Alcohol (consumo excesivo)	No	71,6	22,8	5,6
	Menos de 1 vez al mes	64,9	27,9	7,2
	Al menos 1 vez al mes	67,2	26,8	6,0
p<0,01				
Cannabis, marihuana o hachís	No	69,5	24,2	6,3
	Menos de 1 vez al mes	60,2	36,9	.
	Al menos 1 vez al mes	75,0	21,9	.
p<0,05				
Otras drogas	No	69,6	24,2	6,2
	Sí	58,7	34,0	.
p<0,05				

Porcentajes sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual en cada categoría.
El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente (inferior a 6).

6.3 Vínculo existente con la persona agresora

En lo referente a los agresores mencionados[14] (pareja, expareja o relación afectivo-sexual puntual; personas del ámbito laboral; familiar o conocido, excluyendo parejas o relaciones afectivo-sexuales puntuales o agresores del ámbito laboral; personas desconocidas) por las mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida, no se observan diferencias relevantes según el consumo excesivo de alcohol. En cambio, entre las consumidoras de cannabis y otras drogas se aprecian algunas diferencias descriptivas. Así, estas mujeres mencionan con mayor frecuencia como agresor a una pareja o relación esporádica del sexo masculino (26,7 % entre las consumidoras de cannabis y 30,0 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 8,9 % y 9,5 %, respectivamente, entre las no consumidoras) y a un familiar, amigo o conocido (57,8 % y 60,0 %, frente al 37,2 % y 37,9 %, respectivamente). No obstante, estas diferencias podrían estar relacionadas, al menos parcialmente, con la distinta estructura de edad de consumidoras y no consumidoras.

6.4 Denuncia y búsqueda de ayuda

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la denuncia del acoso sexual según el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses. Tampoco se identifican diferencias en la búsqueda de ayuda formal. En cambio, la búsqueda de ayuda informal es más frecuente entre las mujeres que han realizado consumos excesivos de alcohol y entre las consumidoras de cannabis. Así, el porcentaje de mujeres que han hablado del acoso sexual con personas de su entorno asciende al 68,6 % entre quienes han consumido

[14] Resultados no mostrados en tabla.

alcohol en exceso menos de una vez al mes y al 77,6 % entre quienes han consumido cannabis menos de una vez al mes, frente al 59,1 % y 61,3 %, respectivamente, entre las no consumidoras. Del mismo modo, el indicador conjunto de denuncia y/o búsqueda de ayuda formal o informal presenta porcentajes más elevados entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso y entre las consumidoras de cannabis. No obstante, estas diferencias podrían estar relacionadas, al menos parcialmente, con la distinta estructura de edad de consumidoras y no consumidoras[15].

Al analizar de forma desagregada las distintas fuentes de apoyo[16], las diferencias se concentran fundamentalmente en la ayuda informal. Las mujeres que han realizado consumos excesivos de alcohol y, especialmente, las consumidoras de cannabis declaran con mayor frecuencia haber hablado del acoso sexual con amistades y con su pareja o expareja. Así, el porcentaje que señala haber recurrido a una amistad asciende al 61,7 % y 60,3 % entre quienes han consumido alcohol en exceso menos de una vez al mes y al menos una vez al mes, respectivamente, y al 71,0 % y 66,7 % entre las consumidoras de cannabis, frente al 46,9 % y al 51,0 % observado entre las no consumidoras. Del mismo modo, el recurso a la pareja o expareja alcanza el 26,8 % entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso menos de una vez al mes y el 44,8 % entre las consumidoras de cannabis menos de una vez al mes, frente al 19,4 % y el 21,0 %, respectivamente, entre las no consumidoras. No obstante, estos resultados podrían estar relacionados, al menos parcialmente, con la distinta estructura de edad de consumidoras y no consumidoras.

6.5 Consecuencias del acoso sexual

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la presencia de lesiones físicas derivadas del acoso sexual según el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses[17]. En cambio, las consecuencias psicológicas derivadas del acoso sexual (Tabla 6.38) son más frecuentes entre las mujeres que realizan consumos excesivos de alcohol y entre las consumidoras de cannabis y otras drogas. Así, el porcentaje de mujeres que declara haber sufrido consecuencias psicológicas asciende al 30,0 % entre quienes han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes, al 46,9 % entre las consumidoras frecuentes de cannabis y al 53,1 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 23,5 %, 25,0 % y 25,8 %, respectivamente, entre las no consumidoras.

[15] Resultados no mostrados en tabla.
[16] Resultados no mostrados en tabla.
[17] Resultados no mostrados en tabla.

Tabla 6.38 Consecuencias psicológicas del acoso sexual, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Consecuencias psicológicas
Alcohol (consumo excesivo)	No	23,5
	Menos de 1 vez al mes	32,2
	Al menos 1 vez al mes	30,0
		p<0,001
Cannabis, marihuana o hachís	No	25,0
	Menos de 1 vez al mes	52,7
	Al menos 1 vez al mes	46,9
		p<0,001
Otras drogas	No	25,8
	Sí	53,1
		p<0,001

Porcentajes sobre mujeres que han sufrido acoso sexual en cada categoría.

La presencia de secuelas actuales derivadas del acoso sexual es más frecuente entre las mujeres que han realizado consumos excesivos de alcohol y entre las consumidoras de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (Tabla 6.39). Así, entre las mujeres que han sufrido acoso sexual, el porcentaje que presenta secuelas asciende al 10,3 % entre quienes han consumido alcohol en exceso menos de una vez al mes, al 23,2 % entre las consumidoras de cannabis al menos una vez al mes y al 18,6 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 6,0 %, 6,5 % y 7,0 %, respectivamente, entre las no consumidoras.

Tabla 6.39 Secuelas en la actualidad como consecuencia del acoso sexual, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Secuelas (entre mujeres con lesiones o consecuencias psicológicas)[1]	Secuelas (entre mujeres que han sufrido acoso sexual)[2]
Alcohol (consumo excesivo)	No	25,3	6,0
	Menos de 1 vez al mes	31,4	10,3
	Al menos 1 vez al mes	25,5	7,8
		ns	*p<0,01*
Cannabis, marihuana o hachís	No	25,5	6,5
	Menos de 1 vez al mes	31,7 [b]	16,7 [b]
	Al menos 1 vez al mes	48,4	23,2
		p<0,01	*p<0,001*
Otras drogas	No	26,5	7,0
	Sí	34,9 [b]	18,6 [b]
		ns	*p<0,001*

1. Porcentajes sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida y tuvieron lesiones físicas o consecuencias psicológicas tras los episodios de acoso en cada categoría; 2. Porcentajes sobre el total de mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de la vida en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.
ns= no significativo.

7 Otras formas de acoso sin connotaciones sexuales

7.1 Prevalencia del acoso no sexual

La prevalencia del acoso no sexual es superior entre las mujeres que han realizado consumos excesivos de alcohol y entre las consumidoras de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses que entre las no consumidoras. Esta pauta se observa tanto para el acoso sufrido a lo largo de la vida como en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y durante la infancia. Así, la prevalencia de acoso no sexual a lo largo de la vida alcanza el 29,4 % entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes, frente al 12,6 % entre quienes no lo han hecho. Las diferencias son aún más acusadas en el caso del cannabis y de las otras drogas, alcanzando la prevalencia a lo largo de la vida el 55,9 % entre las consumidoras frecuentes de cannabis y el 60,5 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 15,4 % y el 16,0 %, respectivamente, entre las no consumidoras (Tabla 6.40).

Del mismo modo, la prevalencia de acoso no sexual sufrido durante la infancia asciende al 8,7 % entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes, al 21,8 % entre las consumidoras frecuentes de cannabis y al 25,8 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 3,3 %, 3,9 % y 4,3 %, respectivamente, entre las no consumidoras. Esta mayor prevalencia también se observa para el acoso sufrido en los cuatro años y en los doce meses previos a la entrevista.

Tabla 6.40 Prevalencia del acoso no sexual a lo largo de la vida, en los últimos 4 años, en los últimos 12 meses y en la infancia, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		A lo largo de la vida	Últimos 4 años	Últimos 12 meses	Infancia
Alcohol (consumo excesivo)	No	12,6	5,5	2,3	3,3
	Menos de 1 vez al mes	28,7	14,5	6,6	8,3
	Al menos 1 vez al mes	29,4	14,8	7,7	8,7
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
Cannabis, marihuana o hachís	No	15,4	7,0	3,2	3,9
	Menos de 1 vez al mes	55,8	35,3	16,6	36,2
	Al menos 1 vez al mes	55,9	33,4	18,6	21,8
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001*	*p<0,001*
Otras drogas	No	16,0	7,4	3,4	4,3
	Sí	60,5	41,0	19,7 [b]	25,8
		p<0,001	*p<0,001*	*p<0,001^*	*p<0,001^*

Porcentajes sobre el total de mujeres en cada categoría.
El símbolo 'b' debe interpretarse como "dato con un número de observaciones muestrales de entre 6 y 19" por lo que ha de ser tomado con precaución, ya que puede estar afectado de un elevado error de muestreo.

7.2 Frecuencia

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia con la que se ha padecido el acoso no sexual según el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses[18].

7.3 Vínculo existente con la persona agresora

No se observan diferencias relevantes en el perfil de las personas agresoras implicadas en situaciones de acoso no sexual según el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses[19].

7.4 Denuncia y búsqueda de ayuda

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la denuncia ni en la búsqueda de ayuda formal o informal como consecuencia del acoso no sexual según el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses[20].

7.5 Consecuencias del acoso no sexual

No se observan diferencias estadísticamente significativas en las lesiones físicas, las consecuencias psicológicas ni las secuelas actuales derivadas del acoso no sexual según el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis u otras drogas en los últimos 12 meses[21].

[18] Resultados no mostrados en tabla.
[19] Resultados no mostrados en tabla.
[20] Resultados no mostrados en tabla.
[21] Resultados no mostrados en tabla.

8 Acoso reiterado y acoso digital

La prevalencia del acoso reiterado y del acoso digital es superior entre las mujeres que han realizado consumos excesivos de alcohol y entre las consumidoras de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses que entre las no consumidoras (Tabla 6.41). Así, la prevalencia de acoso reiterado alcanza el 24,1 % entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes, frente al 10,9 % entre quienes no lo han hecho. Las diferencias son aún más acusadas en el caso del cannabis y de las otras drogas, alcanzando la prevalencia del acoso reiterado el 44,9 % entre las consumidoras frecuentes de cannabis y el 44,6 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 13,0 % y el 13,6 %, respectivamente, entre las no consumidoras.

Del mismo modo, la prevalencia del acoso digital asciende al 26,1 % entre las mujeres que han consumido alcohol en exceso al menos una vez al mes, al 50,1 % entre las consumidoras frecuentes de cannabis y al 48,8 % entre las consumidoras de otras drogas, frente al 8,1 %, 11,2 % y 11,9 %, respectivamente, entre las no consumidoras (Tabla 6.41).

Tabla 6.41 Prevalencia del acoso reiterado y del acoso digital a lo largo de la vida, según consumo excesivo de alcohol y consumo de cannabis y otras drogas en los últimos 12 meses (%)

		Acoso reiterado	Acoso digital
Alcohol (consumo excesivo)	No	10,9	8,1
	Menos de 1 vez al mes	23,7	25,4
	Al menos 1 vez al mes	24,1	26,1
		p<0,001	*p<0,001*
Cannabis, marihuana o hachís	No	13,0	11,2
	Menos de 1 vez al mes	50,2	52,5
	Al menos 1 vez al mes	44,9	50,1
		p<0,001	*p<0,001*
Otras drogas	No	13,6	11,9
	Sí	44,6	48,8
		p<0,001	*p<0,001*

Porcentajes sobre el total de mujeres en cada categoría.